

عصر

پنجشنبه

۹۲/۳/۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۲-۹۳

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد



مشخصات داوطلب: نام:

نام خانوادگی:

شماره داوطلب:

↗ داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات
مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال

شماره تماس: ۰۸۱۸۵۰۴۰۵۶-۰۹۸۲۱ (داخلی: ۱۶۲)



دقت
ید.



دانشگاه علوم پزشکی مجازی
Virtual University of Medical Sciences



پرستاری داخلی و جراحی

۱ - پدیده دزهیدراتاسیون، کدامیک از موارد زیر محسوب می‌شود؟

- الف) از دست دادن حجم مایع خارج سلولی بین ۲ تا ۸ درصد وزن بدن
- ب) از دست دادن حجم مایع داخل سلولی بین ۲ تا ۸ درصد وزن بدن
- ج) از دست دادن حجم مایعات کل بدن بین ۲ تا ۸ درصد وزن بدن
- د) از دست دادن حجم مایعات کل بدن منهای حجم خون جاری

۲ - برای دستیابی به اهداف مراقبت توانبخشی، توجه به کدامیک از موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد؟

- الف) برگشت کامل سلامتی و بازیابی توانمندی‌های قبلی بیمار
- ب) برقراری هماهنگی در بین اعضای تیم توانبخشی
- ج) تعریف فرد و خانواده از کیفیت زندگی و برنامه مراقبتی
- د) ایجاد بینش صحیح نسبت به توانبخشی در سازمان

۳ - مهم‌ترین ویژگی مراقبت‌های توانبخشی در برابر مراقبت‌های حاد کدام مورد است؟

- الف) حمایت از افراد و خانواده‌ها در فراغیری مهارت‌های زندگی با بیماری مزمن
- ب) غیرقابل برگشت بودن روند اعاده سلامتی
- ج) هزینه‌بر بودن ابزارهای توانبخشی و کمبود امکانات
- د) وقت‌گیر بودن و نیاز شدید به داشتن برنامه جدی

۴ - چرا پرستار در هنگام گرفتن تاریخچه از بیمار ضروری است به «استفاده مددجو از اقدامات مرتبط با طب مکمل» توجه داشته باشد؟

- الف) چون طب مکمل از مبانی طب‌توین بشمار می‌رود
- ب) بسیاری از مددجویان از فاش شدن به کارگیری طب مکمل خجالت می‌کشند.
- ج) اهمیت تداخل اثر داروهای تجویزی پایستی موردن توجه قرار گیرد
- د) با سیاست‌های کاری مراکز درمانی ممکن است در تضاد باشد.

۵ - یکی از دلایلی که باعث می‌شود جذب دارو در افراد سالمند افزایش بیشتری داشته باشد، کدام مورد است؟

- الف) خالی نگهداشت معده توسط فرد سالمند
- ب) توقف طولانی‌تر مواد خوراکی در دستگاه گوارش
- ج) بالا رفتن میزان آلبومین خون در روند سالمندی
- د) جذب زودهنگام دارو به دلیل زیادی مصرف مایعات

۶ - کدام مورد زیر از نظر «تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از روند سالمندی بر سیستم ایمنی بدن» صحیح است؟

- الف) تشدید کلیه فرآیندهای التهابی ناشی از کمکاری مغز استخوان
- ب) کاهش فعالیت ماکروفازی و تقویت فعالیت سلول‌های B
- ج) شدت یافتن پاسخ‌های التهابی ناشی از پرکاری سلول‌های T
- د) کاهش پاسخ‌های التهابی و اعمال مرتبط با سلول‌های T

۷ - سیستم مراقبتی که بیماری را «نتیجه اختلال و دخالت در اعصاب» دانسته و روی تحرکات نخاعی کار می‌کند، چه نام دارد؟

- Chiropractic Medicine
- Alternative Medicine
- Spinal Physiotherapy
- Sport Medicine

۸ - کدام یک از مراقبت‌های پرستاری در بیماران تحت درمان با تروموبولیتیک‌ها صحیح است؟

- (الف) استفاده مداوم از کاف فشار خون غیرتهدی
- (ب) گرفتن نمونه خون از خط داخل وریدی
- (ج) استفاده از تزریقات عضلانی در صورت نیاز
- (د) کنترل خونریزی‌ها فقط با استفاده از فشار مستقیم

۹ - شایع‌ترین عارضه در ساعات اولیه قرار دادن پیس‌میکر موقت یا دایمی کدام است؟

- (د) خارج شدن الکترود از محل
- (ج) پنوموتوراکس
- (ب) هموتوراکس
- (الف) عفونت موضعی

۱۰ - اولین اقدام پرستاری در سندروم کمپارتمان ناشی از قالب گچی چیست؟

- (الف) تزریق مسکن و ثبت در پرونده
- (ب) بالا نگهداشتن عضو گچ گرفته
- (ج) اطلاع به پزشک معالج
- (د) باز کردن قالب گچی



۱۱ - مداخله پرستاری بعد از انجام بیوپسی استخوان کدام است؟

- (الف) بالا نگهداشتن اندام به مدت ۸ ساعت
- (ب) بانداز کشی محل بیوپسی به مدت ۴۸-۲۴ ساعت
- (ج) استفاده از کیف یخ در محل بیوپسی
- (د) پانسمان کردن محل بیوپسی

۱۲ - مداخلات پرستاری در بیمار مبتلا به کوفتگی کدام است؟

- (الف) استراحت و بالا نگهداشتن عضو مصدوم، استفاده از کیسه یخ و پانسمان فشاری
- (ب) استراحت، تجویز مسکن، کیسه آب گرم و فعالیت محدود
- (ج) کیسه آب گرم و سرد به صورت متناوب، پانسمان فشاری و فعالیت محدود
- (د) استراحت، مصرف مایعات فراوان، کیسه آب گرم و پانسمان فشاری

۱۳ - کدام یک از مراقبت‌های زیر در مورد بیمار دچار شکستگی بسته توسط پرستار ارائه می‌شود؟


- (الف) آموزش روش صحیح کنترل درد و ورم به بیمار و خانواده
- (ب) استراحت و فعالیت متناوب
- (ج) کمک به گچ‌گیری با استفاده از کشش
- (د) کمپرس گرم و سرد به تناوب

۱۴ - کدام یک از موارد زیر هشدار به پرستار برای افزایش شدت آتلکتازی است؟

- (الف) تاکی‌پنه، هیپوتانسیون و سرگیجه
- (ب) عدم تحمل فعالیت، کم‌آبی و تشنجی مفرط
- (ج) تاکی‌پنه، دیس‌پنه و هیپوکسی خفیف تا متوسط
- (د) دیس‌پنه، کم‌آبی و کاهش اشتها

۱۵ - مهم‌ترین توصیه پرستاری به دنبال خونریزی کنترل شده بینی کدام است؟

- (الف) مصرف مایعات کافی، کنترل عالیم حیاتی و کنترل راه هوایی
- (ب) اجتناب از فعالیت‌های بدنی سنگین و عدم مصرف غذای تند و داغ و سیگار
- (ج) کنترل راه هوایی، محدودیت مصرف مایعات و مواد غذایی
- (د) کنترل راه هوایی، عالیم حیاتی و محدودیت مصرف مایعات

- ۱۶ - کدامیک از موارد زیر از تشخیص‌های پرستاری در بیمار مبتلا به پنومونی است؟**
- الف) خطر کمبود دریافت پروتئین به علت مشکلات گوارشی
 - ب) خطر نقصان در حجم مایعات به علت تب و افزایش تعداد تنفس
 - ج) خطر عفونت سیستمیک به علت ضعف سیستم ایمنی
 - د) خطر کاهش سطح هوشیاری و غش به علت کاهش قند خون
- ۱۷ - مددجویی که مبتلابه مشکلات پوستی است، کدامیک از موارد زیر برای استحمام او صحیح است؟**
- الف) استفاده از یک صابون ملایم بدون چربی
 - ب) مرطوب نگهدارشتن دائمی محل ابتلا
 - ج) استفاده از عوامل چربی زدا برای نرم کردن ضایعه
 - د) خشک کردن محل ضایعات با حرکات دوّار حوله
- ۱۸ - توصیه پرستاری برای پیشگیری از وقوع سوختگی کدام است؟**
- 
- الف) عدم استفاده از اتوهای بخاری
 - ب) تنظیم درجه آب گرمکن و کتری برقی بین ۱۵۰-۱۲۰ درجه فارنهایت
 - ج) جداسازی وسایل برقی غیر ضروری از برق در هنگام خروج از منزل
 - د) خاموش سازی روغن شعله ور شده به کمک آب سرد
- ۱۹ - کدام مورد زیر خطر مرگ و میر سوختگی را در سالمندان افزایش می‌دهد؟**
- الف) افزایش مشکلات بینایی و شنوایی
 - ب) کاهش حساهای پوستی
 - ج) کاهش عملکردهای ریوی
 - د) کاهش توان حرکتی
- دانشگاه علوم پزشکی مجازی**
Virtual University of Medical Sciences
- ۲۰ - زمان مناسب برای ارزیابی مجدد وسعت سوختگی کدام است؟**
- الف) ۷۲ ساعت پس از پذیرش در بیمارستان
 - ب) ۴۸ ساعت پس از پذیرش در بیمارستان
 - ج) هشت ساعت پس از پذیرش در بیمارستان
 - د) پس از بستری شدن در بخش اختصاصی سوختگی
- ۲۱ - اولین اولویت در مراقبت از فردی که دچار سوختگی شدید شده کدام است؟**
- الف) شروع مایع درمانی
 - ب) پانسمان سوختگی
 - ج) درمان عفونت
 - د) بررسی و حفظ راه هوایی
- ۲۲ - در بیمار مبتلا به سوختگی درجه دو با وسعت ۲۵ درصد، مورد صحیح کدام است؟**
- الف) کاهش بروندۀ قلب، ثانویه به کاهش حجم خون
 - ب) نمایان شدن مشکلات ریوی، معمولاً بصورت دیررس
 - ج) افزایش حرکات دستگاه گوارش و بروز استفراغ
 - د) فقدان علائم سیستمیک بطور معمول در سوختگی‌های ۲۵ درصد

۲۳ - بیمار مبتلا به گلوكوم، در بخش بستری و تحت درمان دارویی قرار گرفته است. پزشک برای وی قطره هماتروپین هر ۴ ساعت، و قرص استازولامید تجویز نموده است. وظیفه پرستار در مراقبت از این بیمار کدام است؟

- الف) دادن قطره هماتروپین به منظور گشاد نمودن مردمک، طبق دستور
- ب) آموزش به بیمار درباره نحوه استفاده از داروهای فوق
- ج) درخواست از پزشک برای بازنگری برنامه درمانی
- د) بررسی مکرر بیمار از نظر احتمال افزایش وزن بخاطر مصرف استازولامید

۲۴ - آقایی، به علت تاری پیشرونده بینایی، و ضرورت اصلاح کاتاراکت، تحت جراحی قرار گرفته و برای وی IOL استفاده شده است. ۱۲ ساعت پس از جراحی، و بستری شدن در بخش، بیمار دچار ادم شدید قرنیه و درد چشم شده است. پرستار باید پزشک را از نظر احتمال بروز کدام عارضه زیر مطلع سازد؟

- الف) عفونت قرنیه
- ب) اندوفتالمیت

- ج) سندروم سمی بخش قدامی
- د) خونریزی داخل چشمی

۲۵ - پس از جراحی ماستوئیدکتونمی و تمپانوپلاستی، آموزش صحیح کدام است؟

- الف) احتمال احساس دردهای متناوب و تیز در گوش، ۲-۳ هفته بعد از عمل
- ب) خود داری از بلند کردن اجسام سنگین و زور زدن تا ۲ ماه بعد از عمل
- ج) گزارش فوری هرگونه احساس خشکی دهان و اختلال در حس چشایی به پزشک
- د) گزارش هرگونه کاهش شنوایی در روزهای اولیه پس از عمل به پزشک

۲۶ - آموزش مناسب به بیمار مبتلا به هیدروپیس آندولنف کدام اپتیشکی مجازی

- الف) کاهش مصرف مایعات
- ب) مصرف غذاهای حاوی نمک
- ج) استفاده از میان وعده ها
- د) مصرف قهوه هنگام سرگیجه

۲۷ - در آزمون وبر، گزینه صحیح کدام است؟

- الف) شنیدن بهتر صداها توسعه گوش سالمتر
- ب) مشکل انتقال صوت در گوش مبتلا به شنوایی کمتر
- ج) مشکل انتقال صوت در گوش با شنوایی بهتر
- د) مشکل عصبی در گوش با شنوایی بهتر

۲۸ - در صورت داشتن NGT متصل به ساکشن، برای پیشگیری از هیپوناترمی، کدام اقدام ضروریست؟

- الف) ثابت نگهداشتن سطح سدیم خون کمتر از ۱۲۵ mEq/L
- ب) کنترل استفراغ بیمار با دادن داروهای ضد تهوع
- ج) برقراری خط وریدی با سرم قندی ٪۵
- د) شستشوی لوله معده با محلول ایزوتونیک سالین

۲۹ - ضروریست برای کنترل فلبیت ناشی از تزریق پتاسیم وریدی، از سر سوزن نازک استفاده شود. مکانیسم اثر این اقدام کدام مورد است؟

- الف) کنترل درد ناشی از ماده تزریقی
- ب) به حداکثر رسانیدن جریان خون در اطراف سر سوزن
- ج) عدم نیاز به تزریقات مکرر ناشی از خرابی رگ
- د) امکان استفاده از رگهای باریک در بیمار

۳۰ - بیماری در بخش ارولوژی بدلیل نارسایی مزمن کلیه و علایم تهوع، بی‌اشتهاایی و استفراغ بستری شده است. هدف اصلی پرستار در مراقبت از بیمار کدام مورد است؟

- الف) تعادل آب و الکتروولیت‌ها، رژیم غذایی کم پروتئین با سدیم بالا و پتاسیم کم
- ب) کاهش تهوع و استفراغ و برقراری تعادل مایعات و الکتروولیتها
- ج) رژیم غذایی با پروتئین محدود و ارزش بالا، پرکالری، سدیم و پتاسیم کم
- د) کاهش تهوع، رژیم غذایی کم کالری با سدیم و پتاسیم بالا

۳۱ - در بیماری که تحت دیالیز صفاتی قرار دارد علایم پریتونیت مشاهده شده است. چه علائمی تایید کننده بروز این عارضه است؟

- الف) افزایش فشار خون، تهوع، استفراغ و شوک
- ب) درناز مایع خونی، افزایش فشار خون و درد شدید شکم
- ج) تب، عفونت، درناز مایع کدر
- د) درناز مایع کدر، درد منشر شکمی و حساسیت برگشتی، کاهش فشار خون

۳۲ - هدف ورزش عضلات لگن (PME) از جمله ورزش Kegel در بیماران مبتلا به بی‌کنترلی ادرار کدام است؟

- الف) تقویت عضلات مثانه در زنان و پیشگیری از عفونت ادراری
- ب) تقویت عضلات ادراری لگن و افزایش قدرت کنترل ادرار و مدفع در زنان و مردان
- ج) سفت شدگی عضلات ارادی روده در زنان و کمک به کنترل دفع
- د) کمک به بیماران دچار CVA جهت تقویت عضلات دستها و پایها

۳۳ - علایم و اقدامات پرستاری مرتبط با پیلو نفریت حاد کدام است؟

- الف) درد ناحیه کلیه، تب - محدود سازی مصرف مایعات
- ب) الیگوری، درد زیر شکم - محدودیت مصرف مایعات
- ج) تب، لکوسیتوز، وجود باکتری در ادرار، تهوع و استفراغ - پایش میزان مایعات دریافتی
- د) لکوپنی، کاهش درجه حرارت و میزان دفع ادرار - دادن مایعات زیاد به بیمار

۳۴ - کدامیک از موارد زیر در مراقبت پس از بیوپسی کبد صحیح است؟

- الف) خوابانیدن بیمار به سمت چپ و کنترل علایم حیاتی هر ۱۵ دقیقه
- ب) خوابانیدن بیمار به سمت راست و آموزش بیمار جهت جلوگیری از سرفه و عطسه
- ج) جلوگیری از بلند کردن اجسام سنگین به مدت یکماه و کنترل علایم حیاتی تا ۲۴ ساعت اول
- د) قرار دادن بیمار در حالت خوابیده به پشت و بی حرکت کردن او به مدت ۲۴ ساعت

۳۵ - کدامیک از علایم ذیل نشانه‌های کتو اسیدوز دیابتی (DKA) است؟

- الف) دردهای شکمی، تهوع و استفراغ، هایپرونوتیلاسیون و تنفس با بوی میوه
- ب) کاهش قند خون، هیپوونوتیلاسیون و تنفس با بوی سبب گندیده
- ج) هایپرگلیسمیا، هیپوونوتیلاسیون و دردهای شکمی
- د) کوما، هایپرونوتیلاسیون، هیپوگلیسمیا

- ۳۶ - تست "Monofilament" جهت بررسی چه بیمارانی صورت می‌پذیرد و چند نقطه در کف پا باید چک شود؟**
- بررسی وضعیت حسی حرکتی بیماران دیابتی و چهار نقطه
 - بررسی وضعیت حسی بیماران پاراپلزی و پنج نقطه
 - بررسی آستانه حسی بیماران "CVA" و نقاط مختلف اندامها
 - بررسی آستانه حسی بیماران دیابتی و پنج نقطه

- ۳۷ - در آموزش به مبتلایان هایپرتیروئیدیسم دچار اختلال گوارشی و از دادن مایعات و املاح، مصرف چه رژیم غذایی مورد تأکید است؟**

- صرف غذاهای پرکالری، کم پروتئین و مایعات گرم
- استفاده از غذاهای پرکالری، پرپروتئین و عدم مصرف مایعات محرك
- رژیم کم کالری، پرپروتئین و مصرف مایعات شبیه چای و قهوه
- عدم نیاز به رژیم غذایی خاص و تأکید بر درمان دارویی

- ۳۸ - در مراقبت از بیماری که تحت پروسیجر lumber puncture قرار گرفته است، جهت پیشگیری از سر درد، پرستار چه اقداماتی باید انجام دهد؟**

- بالا قرار دادن سر بیمار و محدودیت در مصرف مایعات
- صرف مسکن، دادن مایعات به بیمار، استراحت و پوزیشن prone
- محدودیت مصرف مایعات، صرف مسکن و پوزیشن به پهلو
- کنترل بیمار از نظر خونریزی، محدودیت مصرف مایعات و پوزیشن prone

- ۳۹ - اولین علامت افزایش فشار داخل مغز (ICP) که پرستار بایستی آن را تشخیص دهد کدام است؟**

- میدریاز دو طرفه و عدم پاسخگویی بیمار
- نامتقارن شدن مردمکه افزایش فشار خون و کاهش نبض
- عدم هوشیاری بیمار، افزایش نبض و بی قراری
- تغییر در سطح هوشیاری و آهسته صحبت کردن بیمار، تاخیر در عکس العملها

- ۴۰ - بیماری بدنبال سندروم گیلن باره (Guillain - Barre) در بخش بستری می‌گردد. رعایت کدام نکات پرستاری دارای اهمتی ویژه است؟**

- کاهش ترس و اضطراب بیمار، نگه داری اعمال تنفسی و سیستم حرکتی
- توجه به عملکرد سیستم تنفسی، گوارشی و دفعی بیمار و کاهش افسردگی
- توجه به وضعیت ایمنی بیمار و تقویت سیستم دفاعی
- توجه به سیستم تنفسی و بهبودی تدریجی بیمار

- ۴۱ - کدام یک از تشخیص‌های پرستاری ذیل در مورد بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) صحیح می‌باشد؟**

- اختلال در حرکت فیزیکی در ارتباط با ضعف عضلات و اسپاسم
- اختلال در اکسیژن رسانی در ارتباط با درگیری سیستم تنفسی
- اختلال در بینایی در ارتباط با درگیری سیستم اعصاب مرکزی
- اختلال در سیستم دفعی در رابطه با درگیری نسج کلیه

- ۴۲ - جهت بهبود وضعیت حرکتی بیمار مبتلا به پارکینسون کدام مورد زیر صحیح است؟**

- استفاده به موقع داروها و ورزشهای غیر فعال
- ورزش در هوای گرم و پیاده روی سریع
- استفاده از ماساژ و حمام گرم، آموزش ورزشهای فعال و غیرفعال
- استفاده از کیف آب سرد، ورزش فعال و استراحت بیشتر

۴۳ - در بررسی پوست اطراف استوما در بیمار تحت کلستومی کدام مورد نشان دهنده سلامت تمامیت پوست است؟

- الف) رنگ پریده و سفید
- ب) صورتی متمایل به قرمز
- ج) مرطوب و به رنگ آبی
- د) متورم و قرمز و دردناک

۴۴ - در مراقبت پرستاری از بیمار دچار آلزا ایمپ کدامیک از اقدامات زیر صحیح می باشد؟

- الف) کاهش محركهای محیطی و برقراری برنامه روتین در زندگی
- ب) بستن بیمار در صورت بی قراری و گیجی
- ج) دارو درمانی و کنترل عوارض جانبی داروها
- د) آموزش به بیمار در خصوص مراقبت از خود

۴۵ - در ارزیابی بیماری که گواژ تغذیه ای دارد کدام مورد را باید پرستار در نظر بگیرد؟

- الف) قرار دادن بیمار در پوزیشن صاف در حین ورود مایعات تغذیه ای
- ب) کاهش قند خون و افزایش ناگهانی وزن بدن
- ج) تعویض سوند معده هفته ای یکبار
- د) بررسی میزان حجم باقیمانده قبل از ورود مایعات تغذیه ای

۴۶ - در بیمار تحت رادیوتراپی خارجی که دچار واکنش های پوستی شده است، کدام مورد باید توسط پرستار آموزش داده شود؟

- الف) پوشیدن لباس پشمی ظریف
- ب) مالش ناحیه در صورت خارش
- ج) استحمام روزانه با آب ولرم
- د) استفاده از پدهای گرم کننده

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

۴۷ - در بیمار تحت درمانهای سرطان که دچار بی اشتها بی ای است، وظیفه پرستار کدام مورد است؟

- الف) تشویق بیمار به مصرف مایعات در هنگام صرف غذا
- ب) مصرف غذاهای پر کالری و کم پروتئین
- ج) کاهش میزان تحرک و فعالیت روزانه
- د) کاهش میزان غذای هر وعده و افزایش تعداد دفعات آن

۴۸ - بیمار مبتلا به لوسمی دچار تشنگی، پر ادراری، بی اشتها بی ای است، این علائم حاکی از ابتلا به چه عارضه ای است و به چه مداخله ای نیاز دارد؟

- الف) سندرم ورید اجوف فوقانی، مصرف داروهای فیبرینولیتیک
- ب) هیپر کلسیمی، مصرف مایعات فراوان
- ج) سندرم انعقاد منتشر داخل عروقی، دادن اکسیژن
- د) سندرم ترشح نابجای هورمون ضد ادراری، مصرف مایعات

۴۹ - عاملی که در افراد چاق باعث می شود تا در معرض خطر از دست دادن مایعات بدن قرار گیرند کدام است؟

- الف) افزایش میزان چربی و کاهش مقدار کل مایعات بدن به نسبت وزن
- ب) کاهش توانایی کلیه برای تغییض ادرار
- ج) کمی تحرک و میل به مصرف غذاهای پر انرژی
- د) بی حسی عضلات نگهدارنده کف لگن

- ۵۰ - در مراقبت از بیمار دچار استوماتیت، کدام مورد باید مورد توجه پرستار قرار گیرد؟
- استفاده از دهانشویه‌های تجاری پس از هر وعده غذا
 - شستشوی مرتب دهان با محلول نرمال سالین و آب اکسیژنه
 - صرف آنتی‌بیوتیک موضعی بطور روزانه
 - استفاده روزانه از نخ دندان به شرط پلاکت بالای ۴۰/۰۰۰

پرستاری بهداشت و جامعه

- ۵۱ - در کدام رویکرد «پرستاری خانواده» ابتدا فرد و سپس خانواده مورد توجه است؟
- خانواده به عنوان زمینه
 - خانواده به عنوان مددجو
 - خانواده به عنوان سیستم
 - خانواده به عنوان جزء جامعه

- ۵۲ - تاکید بر توجه پرستاران به ارزش‌های بیماران در امر مراقبت‌های بهداشتی و عدم قضاوت در مورد فرهنگ بیماران براساس اعتقادات شخصی پرستار، بر کدام گزینه دلالت دارد؟

Prejudice (د) Cultural Relativism (ج) Cultural Blindness (ب) (الف) Ethnocentrism

- ۵۳ - «جمع آوری، تحلیل، تفسیر و انتشار نظام مند و مستمر داده‌های اختصاصی سلامت برای استفاده در بهداشت عمومی» تعریف کدام گزینه است؟

- مدیریت اطلاعات سلامت
- بررسی همه‌گیر شناختی
- بررسی شاخصهای بهداشتی
- پایش و مراقبت از بیماری

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

- (الف) افزایش پویایی (ب) افزایش بهره وری (ج) کاهش پویایی (د) کاهش همبستگی

- ۵۵ - برای بررسی خانواده پرستار بهداشت جامعه تصمیم به بازدید از منزل گرفته است، اولین اقدام او کدام است؟
- تماس با خانواده
 - برقراری ارتباط درمانی
 - تنظیم اهداف بازدید
 - افزایش زندگی سالم

- ۵۶ - هدف برنامه «افراد سالم در شهر سالم» کدام است؟

- افزایش سالهای زندگی سالم
- افزایش مشارکت جامعه
- بررسی سلامت جامعه
- برنامه‌ریزی در سطح جامعه

- ۵۷ - علایم رفتاری تجربه شده در طول یا بعد از وقوع حادثه تروماتیک کدام است؟

- (الف) ضربان تندری قلب (ب) تمرين کم (ج) گوشه گیری (د) سرزنش دیگران

- ۵۸ - کدام اقدام برای سالمندان مقیم خانه سالمندان در سطح پیشگیری اول قرار دارد؟

- واکسیناسیون برای پنوموکوک
- بررسی جامع سطح سلامت
- آموزش مراقبت از زخم پای دیابتیک
- غربالگری پر فشاری خون

- ۵۹ -** اثر بخشی برنامه ایمن‌سازی همگانی مبتنی بر کدام است؟
- (الف) افزایش ایمنی جامعه
 - (ب) افزایش سرعت عمل ایمن‌سازی
 - (ج) کاهش منابع مورد نیاز
 - (د) کاهش هزینه‌ها
- ۶۰ -** گسترش شبکه‌های بهداشت و درمان که از سال ۱۳۶۴ شروع شد برای کدام هدف است؟
- (الف) دسترسی همه به مراقبت بهداشتی
 - (ب) پیشگیری از مهاجرت به شهرها
 - (ج) کاهش بار بیماریهای جامعه
 - (د) کاهش هزینه‌های بخش سلامت
- ۶۱ -** مجموعه اعتقادات، ارزش‌ها و پیش‌فرض‌ها درباره زندگی در گروهی از مردم که از نسلی به نسلی منتقل می‌شود، کدام است؟
- 
- (الف) مذهب
 - (ب) فرهنگ
 - (ج) قومیت
 - (د) نژاد
- ۶۲ -** تعییه هود برای اتاق آماده سازی دارو جزو کدام است؟
- (الف) کنترل مدیریتی
 - (ب) کنترل مهندسی
 - (ج) جداسازی مواد مضر
 - (د) پیشگیری ثانویه
- ۶۳ -** کدام خصوصیت آزمون غربالگری، برای یافتن کلیه افراد مبتلا به بیماری در جامعه در معرض خطر و درمان زودرس آنها، باید مدنظر قرار گیرد؟
- 
- (الف) ویژگی
 - (ب) پایایی
 - (ج) حساسیت
 - (د) ارزش اخباری
- ۶۴ -** میزان میرایی از سلطان ریه در گشودمان از کدام الگو تبعیت می‌کند؟
- 
- (الف) روند دوره ای
 - (ب) اپیدمی نقطه ای
 - (ج) روند بلند مدت
 - (د) مکانی - زمانی
- ۶۵ -** در یک مطالعه همگروهی ۱۰۰۰ نفر که از نظر فیزیکی فعال هستند و ۱۰۰۰ نفر به جهت فیزیکی کم تحرک، نسبت خطر (risk ratio) برای ابتلا به بیماری عروق کرونر $4/0$ محاسبه شده است. تفسیر آن کدام است؟
- (الف) بین فعالیت و بیماری عروق کرونر ارتباطی نیست
 - (ب) فعالیت فیزیکی باعث پیشگیری از بیماری عروق کرونر می‌شود
 - (ج) فعالیت فیزیکی باعث تشدید بیماری عروق کرونر می‌شود
 - (د) چون عدد بدست آمده کوچکتر از ۱ است محاسبه نادرست بوده است
- ۶۶ -** برای بررسی بیماریهای نادر کدام نوع طرح تحقیق همه‌گیر شناختی مناسب‌تر است؟
- (الف) همگروهی
 - (ب) بوم شناختی
 - (ج) مورد شاهدی
 - (د) کارآزمایی
- ۶۷ -** کدام معیار برای رابطه علیت ضروری است؟
- (الف) شدت رابطه
 - (ب) رابطه دوز- پاسخ
 - (ج) شواهد تجربی
 - (د) توالی زمانی
- ۶۸ -** پرستار بهداشت جامعه برای ارتقای سلامت جامعه روستایی با نهادهای جامعه ارتباط برقراری می‌کند. این اقدام با کدام اصل مراقبتهاهای بهداشتی اولیه تناسب دارد؟
- (الف) برابری توزیع مراقبتها
 - (ب) اولویت بندی مشکلات جامعه
 - (ج) مشارکت جامعه
 - (د) هماهنگی بین بخشی

۶۹ - ایجاد خانه های بهداشت در شبکه بهداشت و درمان کشور در راستای کدام اصل مراقبتهای بهداشتی اولیه است؟


- (الف) برابری توزیع
- (ب) مشارکت جامعه
- (ج) تدارک داروهای اساسی
- (د) پیشگیری و مبارزه با بیماریهای بومی

۷۰ - کدام واکسن در بد و تولد، قبل از ترجیح نوزاد تزریق می شود؟

- (الف) ام.ام. آر (سرخک، سرخچه، محمک)
- (ب) هپاتیت ب
- (ج) پنوموکوک
- (د) هپاتیت آ

۷۱ - تزریق کدام واکسن در دوران بارداری مجاز است؟

- (د) کزان
- (ج) اوریون
- (ب) سرخچه
- (الف) سرخک



۷۲ - کدام گزینه مربوط به پیشگیری سطح ۲ است؟

- (الف) توزیع رایگان سرنگ به معتادان تزریقی
- (ب) غربالگری معتادان تزریقی برای HIV
- (ج) آموزش روش های انتقال بیماریها
- (د) معرفی معتادان به مراکز ترک اعتیاد

۷۳ - افراد آسیب پذیر نیاز به خدمات مراقبتی از سوی مراکز متعدد دارند. مهمترین نقش پرستار بهداشت جامعه در این راستا کدام است؟

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

الف) شناسایی مراکز ارائه خدمات

ب) همکاری در تاسیس این مراکز

ج) هماهنگی با مراکز و مدیریت نیاز ها

د) همکاری در ارائه خدمات مورد نیاز

۷۴ - پرستار بهداشت جامعه طی بازدید یک منزل در بالای شهر در فصل زمستان، متوجه عدم تناسب لباس سالمند عضو خانواده در حیاط منزل با فصل سرما می شود. کدام گزینه بیشتر محتمل است؟

- (د) افسردگی
- (ج) فقر مالی
- (ب) سوء رفتار
- (الف) غفلت

۷۵ - داشتن اطلاعات کافی درباره عناصر سازمانی فرهنگ ها و گروههای قومی متنوع، به کدام مورد اشاره دارد؟

- (الف) آگاهی فرهنگی
- (ب) صلاحیت فرهنگی
- (ج) دانش فرهنگی
- (د) مهارت فرهنگی

۷۶ - مجموعه اقدامات برای دستیابی به نتایج بهداشتی مورد نظر، تعریف کدام یک از گزینه های زیر است؟

- (الف) سیاست بهداشتی
- (ب) مقررات بهداشتی
- (ج) رویه بهداشتی
- (د) قوانین بهداشتی

۷۷ - دستیابی به بالاترین حد ممکن سلامت برای همه، هدف کدام گزینه است؟

- (الف) سازمان یونیسف
- (ب) سازمان جهانی بهداشت
- (ج) فدراسیون جهانی بهداشت
- (د) موسسه ملی سلامت

۷۸ - برقراری ارتباط بین فردی با جامعه، سیستم، خانواده یا افراد برای افزایش ظرفیت آنها در خود مراقبتی و تطابق کدام است؟

- (د) مشاوره (ج) پیگیری (ب) ارتباط درمانی (الف) آموزش سلامت

۷۹ - غربالگری کودکان سن مدرسه برای تنبلی چشم، کدام نوع غربالگری است؟

- (د) مقطعي (ج) دوره ای (ب) گروه هدف (الف) همگانی

۸۰ - کدام منبع نقطه‌ای آلودگی هوا در جامعه محلی، محسوب می‌شود؟

- (د) سوزاندن زباله‌ها (ج) مصرف دخانیات (ب) وسایل گرمایی (الف) وسایل نقلیه

۸۱ - آموزش احتمال اثر واکسن به سایر اعضاء خانواده در این سازی با کدام واکسن تاکید می‌شود؟

- (د) فلج خوراکی (ج) کزان (ب) دیفتری (الف) سیاه سرف

۸۲ - تشویق به تولید و توزیع رنگهای محلول در آب و فاقد حلال به چه منظور است؟

- (الف) جداسازی مواد شیمیایی مضر
(ب) جایگزینی مواد شیمیایی مضر
(ج) کنترل های مهندسی
(د) کنترل های مدیریتی

۸۳ - پایان غیر قابل برگشت انتقال عفونت در ریشه کنی به واسطه کدام گزینه است؟

- (الف) مصنونیت افراد جامعه
(ب) از بین رفتن کامل عامل بیماری
(ج) کاهش قدرت بیماری باعث
(د) تغییر راههای انتقال عامل

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

۸۴ - برای پیشگیری از ابتلا به عفونت های منتقله از طریق آب در حین مسافرت استفاده از کدام مورد مناسب است؟

- (د) آبی که یک دقیقه جوشیده (ج) آب چاه و قنات (ب) آب یخ (الف) مصنونیت افراد جامعه

۸۵ - در حال حاضر انتقال ویروس نقص ایمنی (HIV) در ایران بیشتر از طریق کدام یک از موارد زیر است؟

- (الف) مادر به کودک، خون و فرآورده های آن
(ب) مادر به کودک، سرنگ های آلوده
(ج) تماس جنسی، سرنگ های آلوده
(د) تماس جنسی، خون و فرآورده های آن

۸۶ - مصرف دارو تحت مشاهده مستقیم کارکنان مراقبت بهداشتی (DOT) برای کدام بیماری مطرح است؟

- (د) سل (ج) هپاتیت (ب) سفلیس (الف) ایدز

۸۷ - پس از وقوع زلزله در شهر، دانش آموzan اخبار را از طریق صدا و سیما دنبال می‌کنند. اقدام اصلی پرستار بهداشت جامعه کدام است؟

- (الف) بررسی و پیگیری وضعیت سلامت دانش آموzan از نظر استرس بعد از حادثه
(ب) تشکیل گروه امداد و نجات با کمک دانش آموzan
(ج) تعطیل نمودن مدرسه و فرستادن دانش آموzan به منزل
(د) آماده سازی دانش آموzan و خانواده برای امداد رسانی

۸۸ - در افرادی که از داروهای ضعیف کننده ایمنی بدن استفاده می‌کنند، کدام واکسن منع مصرف دارد؟

- (د) ب.ث.ژ (ج) سیاهسرفه (ب) دیفتتری (الف) کزان

۸۹ - در موارد مواجهه با خون HbSAg^+ کدام گزینه کارساز تر است؟

- (الف) تزریق واکسن هپاتیت ب
 (ب) تزریق گلبولین ایمن هپاتیت ب
 (ج) تزریق گلبولین ایمن و واکسن هپاتیت ب
 (د) تزریق واکسن هپاتیت ب و داروی ضد ویروس

۹۰ - یافتن بیماران مalaria ای از بین مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی چه نام دارد؟

- (د) پیشگیری دارویی (ج) درمان موارد (ب) مراقبت انفعالی (الف) مراقبت فعال

پرستاری بهداشت روان و روان پرستاری

۹۱ - تعریف موسسه زدایی (Deinstitutionalization) کدام است؟

- (الف) انتقال مبتلایان به بیماری روانی به جامعه
 (ب) عدم پذیرش جامعه در مورد بیماران با اختلال روانی
 (ج) تعیین موسسات و انجمن‌هایی برای کمک به بیماران روانی
 (د) توسعه شبکه‌های خدمات بهداشت روان در سطح ملی

۹۲ - کدامیک از اقدامات زیر جهت کنترل هزینه‌های مراقبت بهداشتی پیشنهاد می‌گردد؟

- دانشگاه علوم پزشکی مجازی**
 Virtual University of Medical Sciences
- (الف) هماهنگی میان بیمه گذارها و شرکت‌های بیمه
 (ب) انجام پژوهش‌های وسیع مرتبط
 (ج) ایجاد مراکز بهداشت روانی
 (د) انجام مراقبت مدیریت شده

۹۳ - فرآخود (super ego) در ساختار شخصیت کدام است؟

- (Conscience) (د) وجود (Awareness) (ج) آگاهی (Values) (ب) ارزشها (ID) (الف) نهاد

۹۴ - شخصی که احساس ترس را به خلق نقاشی‌های زنده و روشن هدایت می‌کند کدام مکانیسم دفاعی زیر را بکار برده است؟

- (الف) بازگشت (Regression)
 (ب) والايش (Sublimation)
 (ج) برون فکنی (Projection)
 (د) سرکوب (Suppression)

۹۵ - هرم نیازهای مازلو بر پایه کدامیک از نظریه‌های زیر بنا شده است؟

- (د) انسان‌گرایی (ب) رفتارگرایی (ج) روانی - اجتماعی (الف) اثبات‌گرایی

۹۶ - خانمی که افزایش وزن خود را به تقصیر کودک دو ساله اش می‌اندازد از کدام مکانیسم دفاعی استفاده کرده است؟

- (الف) عکس العمل سازی (ب) سرکوب (ج) برون فکنی (د) درون فکنی

۹۷ - ویژگی مراقبت معنوی کدام است؟

- الف) توصیه به عبادت کردن
- ب) توجه دادن بیمار به معنی و مفهوم زندگی
- ج) توصیه به عمل کردن به دستورات مذهبی
- د) توصیه به عملکرد اخلاقی

۹۸ - کدامیک از رفتارهای ارتباطی در مداخلات پرستاری موثر است؟

- | | | | |
|----------------|---------------|------------|--------------|
| د) نصیحت گرانه | ج) پرخاشگرانه | ب) قاطعانه | الف) منفعانه |
|----------------|---------------|------------|--------------|

۹۹ - آموزش به مردم جهت ارتقاء سلامت روان در کدامیک از سطح پیشگیری قرار می‌گیرد؟

- | | | | |
|----------|--------|--------|----------|
| د) چهارم | ج) سوم | ب) دوم | الف) اول |
|----------|--------|--------|----------|

۱۰۰ - افرادی که در معرض حوادث تروماتیک شدید مانند جنگ قرار می‌گیرند مستعد کدامیک از اختلالات زیر هستند؟

- | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------------|
| د) استرس پس از سانحه | ج) پانیک | ب) وسواس جبری | الف) اضطراب منتشره |
|----------------------|----------|---------------|--------------------|

۱۰۱ - کمک به مددجو بمنظور بازگشت به مرحله قبل از بیماری در کدام سطح پیشگیری از مراقبت‌های روانی قرار می‌گیرد؟

- | | | | |
|----------|--------|--------|----------|
| د) چهارم | ج) اول | ب) دوم | الف) سوم |
|----------|--------|--------|----------|

۱۰۲ - پرستار در پاسخ به مددجویی که می‌گوید «نمیدانم که بدنبال شغل بگردم و یا محلی برای زندگی» مورد درست

کدام است؟

- الف) من اگر جای شما بودم مطمئناً قبل از جستجوی خانه شغل پیدا می‌کرم

- ب) بنظر می‌رسد که خانه مهمتر از شغل باشد

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

۱۰۳ - کدامیک از اقدامات زیر موجب گردید که مراقبت از بیمار روانی از جنبه نگهداری به درمان تبدیل شود؟

- الف) شوک درمانی
- ب) پیدایش داروهای روانگردان
- ج) محیط درمانی
- د) رواندرمانی

۱۰۴ - عوارض آنتی کولینرژیک داروهای ضد سایکوز کدام است؟

- الف) آگر انولوسیتوز و درماتیت
- ب) تاری دید و اسهال
- ج) خشکی دهان و اشکال در بلعیدن
- د) تعرق زیاد و پوست مرطوب

۱۰۵ - عوارض شایع داروی لیتیوم کدام است؟

- الف) کهیز، علائم پوستی، اضطراب
- ب) کاهش وزن، خشکی چشم، کاهش گلبولهای سفید
- ج) افسردگی، فراموشی، افزایش قند خون
- د) علائم گوارشی، تاری دید، ضعف ماهیچه‌ها

- ۱۰۶ - بحران رشد و تکامل در افراد کدام است؟**
- (الف) زندانی شدن (ب) شاغل شدن
 (ج) صاحب فرزند شدن (د) مرگ عزیزان
- ۱۰۷ - علائم جسمی واکنش سوگ کدام است؟**
- (الف) گریه کردن، تپش قلب، غمگینی
 (ب) کاهش اشتها، احساس فشار روی قفسه سینه، ضعف و خستگی
 (ج) بیخوابی، بیوست، ناامیدی
 (د) خارش، تنگی نفس، احساس فشار روی قفسه سینه
- ۱۰۸ - نیاز به مصرف بیشتر مواد (Substance) برای رسیدن به اثر مطلوب کدام است؟**
- (الف) مقاومت (Tolerance)
 (ب) سندروم محرومیت (Withdrawal)
 (ج) مسمومیت (Poisoning)
 (د) مصرف بیش از حد (Overdose)
- ۱۰۹ - شایعترین توهمندی در اختلال اسکیزوفرنیا کدام است؟**
- (الف) بینایی (ب) شنوایی
 (ج) بویایی (د) لمسی
- ۱۱۰ - تشویق بیمار به بیان احساسات ناامیدی و تنها یی از مداخلات پرستاری کدام یک از اختلالات زیر است؟**
- (الف) اسکیزوفرنیا (ب) مانیا
 (ج) اضطرابی (د) افسردگی
- ۱۱۱ - خانمی که بطور دائم جلوی آئینه صورت خود را از نظر تقارن و زیبایی بررسی می کند، مبتلا به کدام اختلال است؟**
- (الف) هیپوکوندriازیس (ب) چشمگی سازی
 (ج) تبدیلی (د) بد شکلی بدن
- دانشگاه علوم پزشکی مجازی**
Virtual University of Medical Sciences
- ۱۱۲ - مداخلات درمانی در اختلال اضطرابی کدام است؟**
- (الف) مشاوره، دارو درمانی، شوک درمانی
 (ب) دارو درمانی، شوک درمانی، رفتار درمانی
 (ج) مشاوره، روان درمانی، دارو درمانی
 (د) رفتار درمانی، روان درمانی
- ۱۱۳ - اجتناب از موقعیت ها و اشیاء از علائم کدام اختلال است؟**
- (الف) فوبی ساده (ب) اضطراب
 (ج) فوبی اجتماعی (د) وسوس
- ۱۱۴ - اختلال وسوس - اجبار کدام است؟**
- (الف) تکرار رفتار، ارادی است
 (ب) تکرار رفتار، غیر ارادی و اجباری است
 (ج) تکرار رفتار اختیاری و گاهی اجباری است
 (د) تکرار رفتار ارادی و نا آگاهانه است
- ۱۱۵ - بیشترین روش های درمان اختلالات خلقی کدام است؟**
- (الف) دارو درمانی
 (ب) دارو درمانی بهمراه درمانهای تعاملی شناختی رفتاری
 (ج) دارو درمانی بهمراه شوک درمانی
 (د) درمانهای تعامل شناختی رفتاری

- ۱۱۶ - داروهای سه حلقه‌ای ضد افسردگی، منع مصرف در کدام اختلال دارد؟
 د) ادراری ج) خواب ب) تنفسی الف) قلبی
- ۱۱۷ - پرحرفی، هذیان بزرگ منشی، خودمحوری (Omnipotence) در کدامیک از اختلالات زیر دیده می‌شود؟
 د) شخصیت پارانوئید ج) هیستری ب) مانیا الف) اختلالات پارانوئید
- ۱۱۸ - عواملی که می‌تواند سبب کاهش عملکرد شناختی در آلزایمر شود کدام است؟
 الف) بعضی داروها، اختلالات آب و الکتروولیت، عوامل نوروپیولوژیکی
 ب) سن، از دست دادن نزدیکان، کما
 ج) تغییرات محیطی، مهاجرت، داروهای قلبی
 د) تداخل دارویی، اضطراب، بی اشتہایی

۱۱۹ - مداخلات پرستاری در اینمی بیمار آلزایمر کدامست؟

- الف) محیط درمانی، رفتار درمانی، دارو درمانی
 ب) محیط درمانی، شناخت درمانی، دارو درمانی
 ج) تحریک حسی و حرکتی، تنظیم خواب، دارو درمانی
 د) محیط درمانی، کاهش آگاهی به مکان و زمان

۱۲۰ - مداخلات پرستاری در بیمار اسکیزوفرن در چه فازهایی انجام می‌شود؟

- الف) درمانی، پیشگیری، شوک درمانی
 ب) حاد، نگهدارنده، توان بخشی
 ج) حاد، مزمن، پیشگیری
 د) حاد، درمانی، عود کنندگی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

زبان انگلیسی

Part one: vocabulary

Directions: Complete the following sentences by using the most suitable word or phrases below each one.

- 121 . I found many of your suggestions very impressive; I intend to some of them in my plan.
 a. disseminate b. incorporate c. perpetuate d. proliferate
- 122 . Health information administrators apply the science of information to the collection, storage, use and of information.
 a. transaction b. transportation c. transfusion d. transmission
- 123 . The patient's reaction toward the problem was complete withdrawal from the society. She ----- any kind of activity in public.
 a. avoided b. surrounded c. confirmed d. advocated
- 124 . Gastroesophageal reflux is now one of the most common of mankind, confusing medical researchers.
 a. antecedents b. maladies c. expositions d. modalities
- 125 . The goal is to reduce, if not eliminate, all elements of the clubfoot to obtain a functional, flexible, strong, and normal foot.
 a. deformity b. remedy c. maintenance d. remission

- 126 . The information was welcomed by all members of the committee because of its**
- a. deformity
 - b. ambiguity
 - c. accuracy
 - d. deficiency
- 127 . Patients with end stage cardiac disease, not liable to conventional medical or surgical therapies, are for heart transplantation.**
- a. eligible
 - b. reversible
 - c. notorious
 - d. vigorous
- 128 . Nowadays, heart surgeons some of the most complex and challenging operations.**
- a. segregate
 - b. implicate
 - c. aggravate
 - d. undertake
- 129 . Although the link between increased fiber and decreased risk of colorectal cancer is still uncertain, most nutritionists recommend the inclusion of more fibers in the diet.**
- a. ventilation
 - b. consumption
 - c. domination
 - d. simulation
- 130 . To apply such complicated modalities, we need to have equipment.**
- a. redundant
 - b. primitive
 - c. sophisticated
 - d. outdated
- 131 . In treating a terminally ill patient, the physician should determine whether the benefits of treatment its burdens.**
- a. outburst
 - b. overact
 - c. outweigh
 - d. overrun
- 132 . Any understanding of the purpose of health care is going to be influenced by the economic, social, and psychological of health care providers.**
- a. concerns
 - b. contents
 - c. conflicts
 - d. complexes
- 133 . Many people do not know that they are saved from diseases just by public health**
- a. measures
 - b. interferences
 - c. interactions
 - d. manifestations
- 134 . Although some physicians are not willing to accept AIDS patients, they have an ethical to explain their medical problems.**
- a. inspection
 - b. obligation
 - c. instruction
 - d. hallucination
- 135 . Only the reasonable desires of the individual for health care need to be**
- a. spared
 - b. saturated
 - c. satisfied
 - d. spanned
- 136 . Blood tests are important measures to find signs of some malignancies.**
- a. convertible
 - b. hidden
 - c. forbidden
 - d. disposable
- 137 . Great men's services are to mankind.**
- a. invalid
 - b. vague
 - c. vain
 - d. invaluable
- 138 . Recent research suggests that, on average, half of the children of a person with any rare genetic will inherit the disease.**
- a. defect
 - b. profile
 - c. merit
 - d. make-up
- 139 . Although entirely eradicated in most parts of the globe, malaria is still in some regions.**
- a. prevalent
 - b. nonexistent
 - c. improbable
 - d. permeable
- 140 . Anyone in charge of important computer files must be careful about.....deletion of vital information although various data recovery packages might help undo the deletion.**
- a. advantageous
 - b. sufficient
 - c. calculated
 - d. inadvertent

Part two: Reading comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c & d) below each one. Base your answers on the information given only.

Passage 1

Pharmacology as a scientific discipline dates from the mid-1800s, but its development has taken place over many centuries and has been influenced by many different cultures. The discovery of many drugs and medicinal plants was largely through trial and error. Across the world as tribal man foraged for food, he soon realized that his local woodland areas harboured a variety of roots, barks, berries and leaves which were not only sources of food, but also in some cases possessed medicinal (healing, soothing and therapeutic) properties. He also came across other matters that were highly toxic. Information about such plants was handed down from **generation to generation**, providing the basis of much of our knowledge today. One such example is the South American Indians, who gave us the first muscle relaxant: a drug called curare that they smeared onto the tips of their spears to immobilize animals when hunting. Today a drug which possesses similar characteristics is used by doctors to relax their patients' muscles during operations.

141 . According to the text, scientific pharmacology

- a. has existed for many centuries
- b. has influenced several cultures
- c. developed due to cultural influences
- d. first appeared in the mid-1800s

142 . Soothing effects of some plants were first discovered by

- a. some tribal men while hunting
- b. tribal people looking for food
- c. tribes surrounded by trees and bushes
- d. passing the drugs from tribe to tribe

143 . 'curare' was originally used by Indians to

- a. cure sick tribal men
- b. have more efficient spears
- c. eliminate pain and infection
- d. kill enemies in tribal wars

144 . The features of the drug, now, resemble those of the drug used by Indians while hunting.

- a. a highly toxic substance
- b. beneficial in surgery
- c. a muscular stimulant
- d. an effective precursor

145 . The passage is mainly trying to indicate the

- a. principles of pharmacology
- b. components of certain drugs
- c. beneficial effects of some drugs
- d. herbal origin of drugs

Passage 2

Society will be working toward a distribution of basic health care that is adequate for the restoration and preservation of health as society defines it. This basic and adequate health care may be called humane insofar as it protects the dignity of the individual person.

When the absence of a certain types of health care leads to early death, disfigurement, or loss of functions necessary to take one's place in society, we have certainly fallen below the basic minimum of health care for society. In other words, the absent care is part of the basic and adequate minimum. It is basic because, in our society at our stage of ethical, scientific, and technological development, the dignity of the individual demands that we employ reliable and ordinary means to maintain a certain minimum level of treatment. This minimum requires that the individual gain relief from pain, which destroys the higher human functioning, and restores at least the minimum functioning valued by society; that she be spared a death that is the result of trivial or avoidable circumstances; that she be spared disfigurement that will make her repugnant to her society and herself; and that she be spared a loss of function that will make her unable to share the actions, burdens, and accomplishments that membership in society demands. A poorer society than ours might not be able to address many of these concerns due to its lack of abilities and resources.

146 . According to the passage, humane health care could be defined in terms of

- a. preserving a person's true worth
- b. individual's focus on family concerns
- c. equal distribution of health care resources
- d. considering and protecting social demands

147 . We understand from the passage that individuals

- a. are disfigured despite abundant health care
- b. may die from otherwise curable diseases
- c. share concerns of many other people
- d. are respected if function in a proper manner

148 . The underlined pronoun "she" in the text refers to

- a. a specific person in a poor society
- b. the female patient in need of health
- c. the woman addressed by the writer
- d. every member of the society

149 . The text implies that a/an society might not specify its people's basic health care worries.

- a. developed
- b. malfunctioning
- c. impoverished
- d. affluent

150 . The author of this passage believes that human dignity requires that different societies

- a. have the same level of health care
- b. maintain their own minimal level of health care
- c. address the social groups similarly
- d. contribute to poor countries' health care system

Passage 3

A child born in Sweden is almost 30 times more likely to reach the age of five than a child born in Swaziland. While the national rates conceal variations in mortality between the rich and the poor, urban and rural, it is possible to suggest that national wealth is the key factor in determining mortality. However, the evidence clearly indicates that mortality is affected by factors other than national wealth. The most striking example is the comparison between the United States and Cuba. Though life expectancy in both is virtually identical, the former spends less than \$200 per person on healthcare while the latter spends almost \$4,400 per person. Cooper R et al. (2006) state that much of this is due to relatively small amounts invested in infrastructure combined with a well-developed public health strategy. As Copper R et al. go on to emphasize, 'if the experience of Cuba could be extended to other poor and middle-income countries, human health would be transformed'. However, since the 1980s Cuba has also been involved in technology developments. The research, development, and marketing of advanced drugs on a worldwide scale illustrate how much can be achieved by a low-income country.

151 . The passage is mostly discussing

- a. the role of national wealth in health
- b. Cuban experience in health promotion
- c. factors reducing mortality rate
- d. mortality rate among the poor and the rich

152 . Mortality rate can be lowered by

- a. low investment in infrastructure
- b. production of advanced drugs
- c. a suitable public health strategy
- d. life expectancy among people

153 . The comparison made between the USA and Cuba the key role of national wealth in lowering mortality rate.

- a. refutes
- b. approves
- c. elaborates
- d. reaffirms

154 . The comparison between the United States and Cuba reveals that

- a. the former spends more on life expectancy
- b. the latter has a better healthcare system
- c. the average longevity in both is the same
- d. life expectancy in the former is higher

155 . According to Cooper et al., in order to promote public health, the Cuban model of health care system should be

- a. modified
- b. abandoned
- c. transformed
- d. followed

Passage 4

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Researchers have examined data from 500 men followed for 14 years after a prostate biopsy that was found to be benign. This is the first of a group of studies to be conducted in order to determine if there are subpopulations of men diagnosed with benign conditions that may be at a greater risk for developing prostate cancer. Prostate abnormalities were detected in 11 percent of the patients, and after considering factors including family history of prostate cancer, the researchers concluded that obesity at the time of the initial biopsy was associated with a 57 percent increased risk of developing prostate cancer during the 14 years of follow-up. We don't absolutely know what the true biology is because the association was seen only for prostate cancer that occurred earlier in the follow-up period not in its later years. Therefore, this only reflects the association between the body size and larger prostate size, which is thought to reduce the sensitivity of the needle biopsy. It is possible that the tumors missed by initial biopsy grew and were detected in a follow-up biopsy. Although the association found in this study does not prove cause and effect, it indicates that obesity should be considered a factor for follow-ups after a benign prostate biopsy.

156 . Based on the information presented in the passage, about patients from the followed-up population proved to have prostate abnormalities after some years.

- a. 275
- b. 125
- c. 55
- d. 445

157 . The main purpose of these series of studies is to answer the question of whether

- a. benign prostate cases could develop into malignancies in the course of time
- b. cases decided as cancerous could prove to be benign in the course of time
- c. present techniques of biopsy are reliable indicators of the existence of cancer
- d. family history can be considered as a reliable predictor of prostate cancer

158 . Based on the results of the present study, patients who at the time of initial examination were more likely to develop prostate cancer in the subsequent years.


- a. underwent the needle biopsy technique
- b. failed to follow prescriptions
- c. had a family history of prostate cancer
- d. suffered from obesity

159 . The one claim that the author makes as the most likely reason for the observed results is

- a. when examining obese men, needle biopsy loses its sensitivity in finding cancerous cells
- b. obesity contributes to the development of prostate cancer early in the follow-up
- c. family history may contribute to the development of prostate cancer
- d. diagnosis of benign conditions has lost its credibility over years

160 . The factor that causes the biology of what was observed to become less clear is that

- a. tumors were invariably missed in the initial biopsy
- b. the association between the body size and prostate size was not found
- c. cancers were observed only in the initial years of the follow-up period
- d. only some subpopulations of men developed cancer



دانشگاه علوم پزشکی مجازی موفق باشید

Virtual University of Medical Sciences

بسمه تعالیٰ

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای درخواست‌های بررسی سوالاتی است که در قالب مشخصی ارسال می‌گردد، تا رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

داوطلبان می‌بایست پس از اعلام کلید آزمون در ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۹۲/۳/۱۹ درخواست‌های خود را به صورت اینترنتی در قالب فرم زیر که در شبکه اینترنت قرار گرفته است، حداکثر تا ساعت ۱۶ روز جمعه مورخ ۹۲/۳/۲۴ به نشانی www.sanjeshp.ir ارسال نمایند. لذا درخواست‌هایی که به هر شکل، خارج از این فرم یا بعد از زمان تعیین شده به این مرکز ارسال گردد، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تذکر مهم:

فقط درخواست‌های ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی



کد ملی:	نام خانوادگی:	نام:
---------	---------------	------

نام رشته:	نام درس:	شماره سؤال:	نوع دفترچه:
دانشگاه علوم پزشکی مجازی	نام منبع معتبر	سال انتشار	صفحه پاراگراف
			سطر

Virtual University of Medical Sciences

سوال مورد بررسی:

- بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)
- جواب صحیح ندارد.
- متن سوال صحیح نیست.
- با منبع اعلام شده قابل پاسخگویی نیست.

توضیحات: