


عصر

پنجشنبه

۹۲/۳/۹

سال تحصیلی ۹۲-۹۳

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد



مشخصات داوطلب: نام:

نام خانوادگی:

شماره داوطلب:

↗ داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات
مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال



دانشگاه علوم پزشکی مجازی
Virtual University of Medical Sciences

شماره تماس: ۰۸۱۸۵۰۴۰۵۶-۰۹۸۲۱ (داخلی: ۱۶۲)



دقت
ید.

پرستاری داخلی و جراحی

- ۱ -** پدیده دزهیدراتاسیون، کدام یک از موارد زیر محسوب می‌شود؟
- الف) از دست دادن حجم مایع خارج سلولی بین ۲ تا ۸ درصد وزن بدن
 - ب) از دست دادن حجم مایع داخل سلولی بین ۲ تا ۸ درصد وزن بدن
 - ج) از دست دادن حجم مایعات کل بدن بین ۲ تا ۸ درصد وزن بدن
 - د) از دست دادن حجم مایعات کل بدن منهای حجم خون جاری
- ۲ -** برای دستیابی به اهداف مراقبت توانبخشی، توجه به کدام یک از موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد؟
- الف) برگشت کامل سلامتی و بازیابی توانمندی‌های قبلی بیمار
 - ب) برقراری هماهنگی در بین اعضای تیم توانبخشی
 - ج) تعریف فرد و خانواده از کیفیت زندگی و برنامه مراقبتی
 - د) ایجاد بینش صحیح نسبت به توانبخشی در سازمان
- ۳ -** چرا پرستار در هنگام گرفتن تاریخچه از بیمار ضروری است به «استفاده مددجو از اقدامات مرتبط با طب مکمل» توجه داشته باشد؟
- الف) چون طب مکمل از مبانی طب نوین بشمار می‌رود.
 - ب) بسیاری از مددجویان از فاش شدن به کارگیری طب مکمل خجالت می‌کشند.
 - ج) اهمیت تداخل اثر داروهای تجویزی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
 - د) با سیاست‌های کاری مراکز درمانی ممکن است در تضاد باشد.
- ۴ -** یکی از دلایلی که باعث می‌شود جذب دارو در افراد سالم‌مند افزایش بیشتری داشته باشد، کدام مورد است؟
- الف) خالی نگهداشت معده توسط فرد سالم‌مند
 - ب) توقف طولانی تر مواد خوراکی در دستگاه آکوارش
 - ج) بالا رفتن میزان آلبومین خون در روند سالم‌مندی
 - د) جذب زودهنگام دارو به دلیل زیادی مصرف مایعات
- ۵ -** کدام مورد زیر از نظر «تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از روند سالم‌مندی بر سیستم ایمنی بدن» صحیح است؟
- الف) تشدید کلیه فرآیندهای التهابی ناشی از کمکاری مغز استخوان
 - ب) کاهش فعالیت ماکروفازی و تقویت فعالیت سلول‌های B
 - ج) شدت یافتن پاسخ‌های التهابی ناشی از پرکاری سلول‌های T
 - د) کاهش پاسخ‌های التهابی و اعمال مرتبط با سلول‌های T
- ۶ -** بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی (CCU) با تشخیص انفارکتوس میوکارد در نیمه‌های شب دچار تنگی نفس، اتساع وریدهای گردن و سرفهای بدون وقفه همراه با خلط می‌شود. مناسب‌ترین و ضروری‌ترین اقدام پرستاری برای این بیمار چیست؟
- الف) تجویز اکسیژن با غلظت کم
 - ب) تجویز پتیدین با مقادیر کم (۲ تا ۵ میلی‌گرم)
 - ج) قرار دادن بیمار در وضعیت نشسته قائم
 - د) گرفتن نوار قلب

۷ - کدامیک از مراقبت‌های پرستاری در بیماران تحت درمان با تروموبولیتیک‌ها صحیح است؟

- الف) استفاده مداوم از کاف فشار خون غیرتهاجمی
- ب) گرفتن نمونه خون از خط داخل وریدی
- ج) استفاده از تزریقات عضلانی در صورت نیاز
- د) کنترل خونریزی‌ها فقط با استفاده از فشار مستقیم

به منظور تامین خونرسانی کافی به بافت‌ها در بیمار مبتلا به سندروم کرونری حاد، مهم‌ترین اقدام پرستاری کدام است؟

- الف) رعایت پوزیشن خوابیده به پشت
- ب) کنترل مستمر درجه حرارت پوست و نبض‌های محیطی
- ج) انجام ماساژ پوستی و تغییر وضعیت
- د) حمام گرم حداقل یک بار در روز با استفاده از وان

۸ - بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی (CCU) با تشخیص انفارکتوس حاد دچار ایست قلبی ناشی از فیبریلاسیون بطنی شده است. اولین اقدام پرستاری در احیا قلبی- ریوی کدام است؟

- د) ماساژ قلبی
- ج) تزریق اپی‌نفرین
- ب) حفظ راه هوایی
- الف) تجویز اکسیژن

۹ - اولین اقدام پرستاری در سندروم کمپارتمان ناشی از قالب گچی چیست؟

- الف) تزریق مسکن و ثبت در پرونده
- ب) بالا نگهداشتن عضو گچ گرفته
- ج) اطلاع به پزشک معالج
- د) باز کردن قالب گچی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

۱۰ - مداخله پرستاری بعد از انجام بیوپسی استخوان کدام است؟

- الف) بالا نگهداشتن اندام به مدت ۸ ساعت
- ب) بانداز کشی محل بیوپسی به مدت ۴۸-۴۸ ساعت
- ج) استفاده از کیف یخ در محل بیوپسی
- د) پانسمان کردن محل بیوپسی

۱۱ - مداخلات پرستاری در بیمار مبتلا به کوفتگی کدام است؟

- الف) استراحت و بالا نگهداشتن عضو مصدوم، استفاده از کیسه یخ و پانسمان فشاری
- ب) استراحت، تجویز مسکن، کیسه آب گرم و فعالیت محدود
- ج) کیسه آب گرم و سرد به صورت متناوب، پانسمان فشاری و فعالیت محدود
- د) استراحت، مصرف مایعات فراوان، کیسه آب گرم و پانسمان فشاری

۱۲ - کدامیک از مراقبت‌های زیر در مورد بیمار دچار شکستگی بسته توسط پرستار ارائه می‌شود؟

- الف) آموزش روش صحیح کنترل درد و ورم به بیمار و خانواده
- ب) استراحت و فعالیت متناوب
- ج) کمک به گچ‌گیری با استفاده از کشش
- د) کمپرس گرم و سرد به تناوب

۱۴ - کدام یک از موارد زیر هشدار به پرستار برای افزایش شدت آتلکتازی است؟

- (الف) تاکی‌پنه، هیپوتانسیون و سرگیجه
- (ب) عدم تحمل فعالیت، کم‌آبی و تشنجی مفرط
- (ج) تاکی‌پنه، دیس‌پنه و هیپوکسی خفیف تا متوسط
- (د) دیس‌پنه، کم‌آبی و کاهش اشتها

۱۵ - در عفونت‌های قسمت فوقانی دستگاه تنفسی کدام مداخله پرستاری توصیه می‌شود؟

- (الف) افزایش مایعات دریافتی و استفاده از بخور به منظور کاهش غلظت ترشحات
- (ب) استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های تجویز شده با ناظارت پرستار و مصرف داروهای بازکننده برونش‌ها
- (ج) استفاده از دوش آب گرم همراه با مصرف به موقع داروها
- (د) تعادل بین استراحت، فعالیت و کنترل مصرف مایعات دریافتی

۱۶ - مهم‌ترین توصیه پرستاری به دنبال خونریزی کنترل شده بینی کدام است؟

- (الف) مصرف مایعات کافی، کنترل عالیم حیاتی و کنترل راه هوایی
- (ب) اجتناب از فعالیت‌های بدنی سنگین و عدم مصرف غذای تند و داغ و سیگار
- (ج) کنترل راه هوایی، محدودیت مصرف مایعات و مواد غذایی
- (د) کنترل راه هوایی، عالیم حیاتی و محدودیت مصرف مایعات

۱۷ - کدام یک از موارد زیر از تشخیص‌های پرستاری در بیمار مبتلا به پنومونی است؟

- (الف) خطر کمبود دریافت پرتوئین به علت مشکلات گوارشی
- (ب) خطر نقصان در حجم مایعات به علت تب و افزایش تعداد تنفس
- (ج) خطر عفونت سیستمیک به علت ضعف سیستم ایمنی
- (د) خطر کاهش سطح هوشیاری و غش به علت کاهش قند خون

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

۱۸ - مددجویی که مبتلا به مشکلات پوستی است، کدامیک از موارد زیر برای استحمام او صحیح است؟

- (الف) استفاده از یک صابون ملایم بدون چربی
- (ب) مرطوب نگهداشتن دائمی محل ابتلا
- (ج) استفاده از عوامل چربی زدا برای نرم کردن ضایعه
- (د) خشک کردن محل ضایعات با حرکات دوّار حوله

۱۹ - کدام مورد زیر خطر مرگ و میر سوختگی را در سالمندان افزایش می‌دهد؟

- (الف) افزایش مشکلات بینایی و شنوایی
- (ب) کاهش حسنهای پوستی
- (ج) کاهش عملکردهای ریوی
- (د) کاهش توان حرکتی

۲۰ - اولین اولویت در مراقبت از فردی که دچار سوختگی شدید شده کدام است؟

- (الف) شروع مایع درمانی
- (ب) پانسمان سوختگی
- (ج) درمان عفونت
- (د) بررسی و حفظ راه هوایی

۲۱ - در بیمار مبتلا به سوختگی درجه دو با وسعت ۲۵ درصد، مورد صحیح کدام است؟

- الف) کاهش برونده قلب، ثانویه به کاهش حجم خون
- ب) نمایان شدن مشکلات ریوی، معمولاً بصورت دیررس
- ج) افزایش حرکات دستگاه گوارش و بروز استفراغ
- د) فقدان علائم سیستمیک بطور معمول در سوختگیهای ۲۵ درصد

۲۲ - بیمار مبتلا به گلوکوم، در بخش بستری و تحت درمان داروبی قرار گرفته است. پزشک برای وی قطره هماترопین


هر ۴ ساعت، و قرص استازولامید تجویز نموده است. وظیفه پرستار در مراقبت از این بیمار کدام است؟

- الف) دادن قطره هماترپین به منظور گشاد نمودن مردمک، طبق دستور
- ب) آموزش به بیمار درباره نحوه استفاده از داروهای فوق
- ج) درخواست از پزشک برای بازنگری برنامه درمانی
- د) بررسی مکرر بیمار از نظر احتمال افزایش وزن بخاطر مصرف استازولامید

۲۳ - آقایی، به علت تاری پیشرونده بینایی، و ضرورت اصلاح کاتاراکت، تحت جراحی قرار گرفته و برای وی IOL

استفاده شده است. ۱۲ ساعت پس از جراحی، و بستری شدن در بخش، بیمار دچار ادم شدید قرنیه و درد چشم

شده است. پرستار باید پزشک را از نظر احتمال بروز کدام عارضه زیر مطلع سازد؟



- الف) عفونت قرنیه

- ب) انوفتالمیت

- ج) سندرم سمی بخش قدامی

- د) خونریزی داخل چشمی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

۲۴ - پس از جراحی ماستوئیدکتومی و تمپانوپلاستی، آموزش صحیح کدام است؟

Virtual University of Medical Sciences

- الف) احتمال احساس دردهای متفاوت با تغییر دیگوش، ۲۳ هفتگه بعد از عمل
- ب) خود داری از بلند کردن اجسام سنگین و زور زدن تا ۲ ماه بعد از عمل
- ج) گزارش فوری هرگونه احساس خشکی دهان و اختلال در حس چشایی به پزشک
- د) گزارش هرگونه کاهش شنوایی در روزهای اولیه پس از عمل به پزشک

۲۵ - آموزش مناسب به بیمار مبتلا به هیدروپس آندولنف کدام است؟

- الف) کاهش مصرف مایعات
- ب) مصرف غذاهای حاوی نمک
- ج) استفاده از میان وعده ها
- د) مصرف قهوه هنگام سرگیجه

۲۶ - در صورت داشتن NGT متصل به ساکشن، برای پیشگیری از هیپوناترمی، کدام اقدام ضروریست؟

- الف) ثابت نگهداشتن سطح سدیم خون کمتر از 125 mEq/L

- ب) کنترل استفراغ بیمار با دادن داروهای ضد تهوع

- ج) برقراری خط وریدی با سرم قندی 7.5%

- د) شستشوی لوله معده با محلول ایزوتونیک سالین

۲۷ - ضروریست برای کنترل فلوبیت ناشی از تزریق پتاسیم وریدی، از سر سوزن نازک استفاده شود. مکانیسم اثر این اقدام کدام مورد است؟

- الف) کنترل درد ناشی از ماده تزریقی
- ب) به حداکثر رسانیدن جریان خون در اطراف سر سوزن
- ج) عدم نیاز به تزریقات مکرر ناشی از خرابی رگ
- د) امکان استفاده از رگهای باریک در بیمار

۲۸ - بیماری در بخش ارولوژی بدلیل نارسایی مزمن کلیه و عالیم تهوع، بی‌اشتهاایی و استفراغ بستری شده است. هدف اصلی پرستار در مراقبت از بیمار کدام مورد است؟

- الف) تعادل آب و الکترولیت‌ها، رژیم غذایی کم پروتئین با سدیم بالا و پتاسیم کم
- ب) کاهش تهوع و استفراغ و برقراری تعادل مایعات و الکترولیتها
- ج) رژیم غذایی با پروتئین محدود و ارزش بالا، پرکالری، سدیم و پتاسیم کم
- د) کاهش تهوع، رژیم غذایی کم کالری با سدیم و پتاسیم بالا

۲۹ - عالیم و اقدامات پرستاری مرتبط با پیلو نفریت حاد کدام است؟

- الف) درد ناحیه کلیه، تب - محدود سازی مصرف مایعات
- ب) الیگوری، درد زیر شکم - محدودیت مصرف مایعات
- ج) تب، لکوسیتوز، وجود باکتری در ادرار، تهوع و استفراغ - پایش میزان مایعات دریافتی
- د) لکوپنی، کاهش درجه حرارت و میزان دفع ادرار - دادن مایعات زیاد به بیمار

۳۰ - کدامیک از موارد زیر در مراقبت پس از بیوپسی کبد صحیح است؟

- الف) خوابانیدن بیمار به سمت چپ و کنترل عالیم حیاتی هر ۱۵ دقیقه
- ب) خوابانیدن بیمار به سمت راست و آموزش بیمار جنبه‌جذبه و عضله
- ج) جلوگیری از بلند کردن اجسام سنگین به مدت یکماه و کنترل عالیم حیاتی تا ۲۴ ساعت اول
- د) قرار دادن بیمار در حالت خوابیده به پشت و بی‌حرکت کردن او به مدت ۲۴ ساعت

۳۱ - کدامیک از عالیم ذیل نشانه‌های کتو اسیدوز دیابتی (DKA) است؟

- الف) دردهای شکمی، تهوع و استفراغ، هایپرونوتیلاسیون و تنفس با بوی میوه
- ب) کاهش قند خون، هیپونوتیلاسیون و تنفس با بوی سیب گندیده
- ج) هایپرگلیسمیا، هیپونوتیلاسیون و دردهای شکمی
- د) کوما، هایپرونوتیلاسیون، هیپوگلیسمیا

۳۲ - در مراقبت از بیماری که تحت پروسیجر lumber puncture قرار گرفته است، جهت پیشگیری از سر درد، پرستار چه اقداماتی باید انجام دهد؟

- الف) بالا قرار دادن سر بیمار و محدودیت در مصرف مایعات
- ب) مصرف مسکن، دادن مایعات به بیمار، استراحت و پوزیشن prone
- ج) محدودیت مصرف مایعات، مصرف مسکن و پوزیشن به پهلو
- د) کنترل بیمار از نظر خونریزی، محدودیت مصرف مایعات و پوزیشن prone

۳۳ - اولین علامت افزایش فشار داخل مغز (ICP) که پرستار بایستی آن را تشخیص دهد کدام است؟

- الف) میدریاز دو طرفه و عدم پاسخگویی بیمار
- ب) نامتقارن شدن مردمکها، افزایش فشار خون و کاهش نبض
- ج) عدم هوشیاری بیمار، افزایش نبض و بی قراری
- د) تغییر در سطح هوشیاری و آهسته صحبت کردن بیمار، تاخیر در عکس العملها

۳۴ - کدام یک از تشخیص‌های پرستاری ذیل در مورد بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) صحیح می‌باشد؟

- الف) اختلال در حرکت فیزیکی در ارتباط با ضعف عضلات و اسپاسم
- ب) اختلال در اکسیژن رسانی در ارتباط با درگیری سیستم تنفسی
- ج) اختلال در بینایی در ارتباط با درگیری سیستم اعصاب مرکزی
- د) اختلال در سیستم دفعی در رابطه با درگیری نسج کلیه

۳۵ - جهت بهبود وضعیت حرکتی بیمار مبتلا به پارکینسون کدام مورد زیر صحیح است؟

- الف) استفاده به موقع داروها و ورزشهای غیر فعال
- ب) ورزش در هوای گرم و پیاده روی سریع
- ج) استفاده از ماساژ و حمام گرم، آموزش ورزشهای فعال و غیرفعال
- د) استفاده از کیف آب سرد، ورزش فعال و استراحت بیشتر

۳۶ - در بررسی پوست اطراف استوما در بیمار تحت کلستومی کدام مورد نشان دهنده سلامت تمامیت پوست است؟

- الف) رنگ پریده و سفید
- ب) صورتی متمایل به قرمز
- ج) مرطوب و به رنگ آبی
- د) متورم و قرمز و دردناک

۳۷ - در ارزیابی بیماری که گاواز تغذیه‌ای دارد کدام مورد را باید پرستار در نظر بگیرد؟

- Virtual University of Medical Sciences
- الف) قرار دادن بیمار در پوزیشن صاف در حین ورود مایعات تغذیه‌ای
 - ب) کاهش قند خون و افزایش ناگهانی وزن بدن
 - ج) تعویض سوند معده هفته‌ای یکبار
 - د) بررسی میزان حجم باقیمانده قبل از ورود مایعات تغذیه‌ای

۳۸ - در بیمار تحت رادیوتراپی خارجی که دچار واکنش‌های پوستی شده است، کدام مورد باید توسط پرستار آموزش داده شود؟

- الف) پوشیدن لباس پشمی ظریف
- ب) مالش ناحیه در صورت خارش
- ج) استحمام روزانه با آب ولرم
- د) استفاده از پدهای گرم کننده

۳۹ - عاملی که در افراد چاق باعث می‌شود تا در معرض خطر از دست دادن مایعات بدن قرار گیرند کدام است؟

- الف) افزایش میزان چربی و کاهش مقدار کل مایعات بدن به نسبت وزن
- ب) کاهش توانایی کلیه برای تغليظ ادرار
- ج) کمی تحرک و میل به مصرف غذاهای پر انرژی
- د) بی حسی عضلات نگهدارنده کف لگن

- ۴۰ - در مراقبت از بیمار دچار استوماتیت، کدام مورد باید مورد توجه پرستار قرار گیرد؟
- استفاده از دهانشوندهای تجاری پس از هر وعده غذا
 - شستشوی مرتب دهان با محلول نرمال سالین و آب اکسیژنه
 - صرف آنتی‌بیوتیک موضعی بطور روزانه
 - استفاده روزانه از نخ دندان به شرط پلاکت بالای ۴۰/۰۰۰

پرستاری کودکان

- ۴۱ - حس تجربه شده مهم در کودک مبتلا به «شوك فرهنگی» کدام است؟
- خودفراموشی
 - ترس
 - خشونت
 - شادی غیر معمولی
- ۴۲ - تعامل اعضای خانواده با همدیگر، به خصوص کیفیت این تعاملات و ارتباطات، اشاره به کدام جزء خانواده دارد؟
- عملکرد
 - ساختار
 - ترکیب
 - فرهنگ



دانشکده علوم زیستکار محاذی Virtual University of Medical Sciences

- ۴۳ - در مصاحبه پرستار با والدین کودک، کدام گزینه صحیح است؟
- از سؤالات مستقیم و اختصاصی بیشتر استفاده شود.
 - سؤالات مصاحبه پاسخ کوتاه داشته باشند.
 - از سؤالات کلی و باز استفاده شود.
 - با تحریک احساسات والدین همراه باشد.

دانشکده علوم زیستکار محاذی Virtual University of Medical Sciences

- ۴۴ - در اندازه‌گیری فشار خون کودکان، کدام صحیح است؟
- در صورت عدم وجود کاف مناسب از نظر اندازه، کاف بزرگتر استفاده شود.
 - کاف فشار سنج بر اساس نام کاف (مثلاً کاف شیرخوار) انتخاب شود.
 - در صورت عدم وجود کاف مناسب از نظر اندازه، از محل دیگر فشار خون اندازه‌گیری شود.
 - کاف فشار سنج باید بعد از بسته شدن، به اندازه دو انگشت دست شل باشد.

- ۴۵ - مادری از دفع قهوه‌ای متمایل به سبز رنگ نوزاد خود در روز سوم بعد از شروع تغذیه نگران است، پاسخ مناسب پرستار کدام است؟
- این حالت طبیعی است.
 - احتمالاً وجود صفراء است.
 - نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.
 - به دلیل کاهش حرکات روده است.

دانشکده علوم زیستکار محاذی Virtual University of Medical Sciences

- ۴۶ - درصد خواب فعال (Active Sleep) نوزادان نارس از کل خواب کدام است؟

۷۰	۵۰	۳۰	۱۰
(د)	(ج)	(ب)	(الف)

- ۴۷ - مهم‌ترین نشانه فتق دیافراگمی مادرزادی در نوزادان کدام است؟

د) افت ضربان قلب	ج) دهان کف آولد	ب) شکم برجسته	الف) دیسترس تنفسی حاد
------------------	-----------------	---------------	-----------------------

- ۴۸ - در کدام یک از موارد زیر، نیاز به دریافت مایعات در کودکان افزایش می‌یابد؟

الف) نارسایی احتقانی قلب	ب) نارسایی کلیه (ولیگوریک)	ج) استفاده از تهويه مکانیکی	د) سوختگی
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------

- ۴۹ -** در کودکی که دچار اسهال خفیف شده است، توصیه‌ی شما کدام است؟
- (الف) مصرف محلول‌های الکترولیتی (ORS)
 - (ب) مصرف آب میوه
 - (ج) تزریق وریدی رینگر لاكتات
 - (د) ناشتا نگه داشتن کودک
- ۵۰ -** رژیم غذایی مناسب در کودکان مبتلا به سوختگی کدام است؟
- (الف) پرپروتئین و کم کالری
 - (ب) پرپروتئین و پرکالری
 - (ج) کم پروتئین و کم کالری
 - (د) کم پروتئین و پرکالری
- ۵۱ -** در کدام روش تجویز اکسیژن، احتمال نفخ و ناراحتی شکم وجود دارد؟
- (الف) ماسک اکسیژن
 - (ب) چادر اکسیژن
 - (ج) سوند بینی
 - (د) هود اکسیژن
- ۵۲ -** در نوزاد مبتلا به تنگی هیپرتروفیک پیلور، قبل از عمل جراحی بهترین روش تغذیه کدام است؟
- (الف) استفاده از قطره‌چکان
 - (ب) لوله‌ی بینی معده
 - (ج) راه وریدی
 - (د) گاستروستومی
- ۵۳ -** در پرستاری از کودک تحت درمان با شیمی درمانی، بهترین توصیه‌ی شما به والدین کدام است؟
- (الف) تشویق به بازی با همسالان
 - (ب) شرکت در برنامه‌های ورزشی مدرسه
 - (ج) خواب منظم و استراحت دوره‌ای
 - (د) تشویق به فعالیت‌های اجتماعی
- ۵۴ -** بعد از عمل برداشتن لوزه، در صورتی که کودک کاملاً بیدار نباشد، پوزیشن مناسب کدام است؟
- (الف) خوابیده به پشت
 - (ب) خوابیده به پهلو
 - (ج) نیمه نشسته
 - (د) نشسته
- ۵۵ -** در کودک مبتلا به سندروم کوشینگ، بهترین زمان مصرف داروهای استروئیدی کدام است؟
- (الف) صبح زود
 - (ب) همراه با ناهار
 - (ج) بعد از ظهر
 - (د) همراه با شام
- ۵۶ -** کدام یک از مسایل شایع دوران نوپایی است؟
- (الف) شروع فرایند دلبستگی
 - (ب) رشد و تکامل سریع
 - (ج) بی‌اشتهاایی فیزیولوژیک
 - (د) تطابق با استرس‌ها
- ۵۷ -** نارسایی در مراقبت از کودکان بیشتر مربوط به کدام است؟
- (الف) آزارهای جسمی توسط بزرگسالان
 - (ب) آزارهای جنسی توسط افراد غریبه
 - (ج) غفلت در مراقبت توسط والدین
 - (د) آزارهای روانی توسط معلمان
- ۵۸ -** اصلی‌ترین بیماری روانی - رفتاری مربوط به دوران مدرسه کدام است؟
- (الف) بیش فعالی
 - (ب) اسکیزوفرنیا
 - (ج) افسردگی
 - (د) ترس از مدرسه
- ۵۹ -** توصیه پرستار در درمان اولیه آکنه کدام است؟
- (الف) مراقبت‌های تغذیه‌ای
 - (ب) آنتی بیوتیک سیستمیک
 - (ج) درمان‌های موضعی
 - (د) شستشو با آب و صابون با PH پایین

- ۶۰ - توصیه رفتاری مناسب برای پیشگیری از چاقی در نوجوانان کدام است؟
- گذاشتن کامپیوتر در اطاق خواب
 - رفتن پیاده به نزدیکترین رستوران
 - تماشای تلویزیون کمتر از ۲ ساعت در ۲۴ ساعت
 - صرف کمتر مواد غذایی

روان پرستاری

- ۶۱ - تعریف موسسه زدایی (Deinstitutionalization) کدام است؟
- انتقال مبتلایان به بیماری روانی به جامعه
 - عدم پذیرش جامعه در مورد بیماران با اختلال روانی
 - تعیین موسسات و انجمن هایی برای کمک به بیماران روانی
 - توسعه شبکه های خدمات بهداشت روان در سطح ملی



- ۶۲ - شخصی که احساس ترس را به خلق نقاشی های زنده و روش هدایت می کند کدام مکانیسم دفاعی زیر را بکار برده است؟

- بازگشت (regression)
- والایش (Sublimation)
- برون فکنی (Projection)
- سرکوب (Suppression)

- ۶۳ - هرم نیازهای مازلو بر پایه کدامیک از نظریه های زیر بنا شده است؟
- اثبات گرایی
 - رفتارگرایی
 - روانی- اجتماعی
 - انسان گرایی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

- ۶۴ - ویژگی مراقبت معنوی کدام است؟
- توصیه به عبادت کردن
 - توجه دادن بیمار به معنی و مفهوم زندگی
 - توصیه به عمل کردن به دستورات مذهبی
 - توصیه به عملکرد اخلاقی

- ۶۵ - افرادی که در معرض حوادث تروماتیک شدید مانند جنگ قرار می گیرند مستعد کدامیک از اختلالات زیر هستند؟
- اضطراب منشره
 - وسواس جبری
 - پانیک
 - استرس پس از سانحه

- ۶۶ - کمک به مددجو بمنظور بازگشت به مرحله قبل از بیماری در کدام سطح پیشگیری از مراقبت های روانی قرار می گیرد؟
- سوم
 - دوم
 - اول
 - چهارم

- ۶۷ - پرستار در پاسخ به مددجویی که می گوید «نمی دانم که به دنبال شغل بگردم و یا محلی برای زندگی» مورد صحیح کدام است؟

- من اگر جای شما بودم مطمئنا قبل از جستجوی خانه شغل پیدا می کردم
- بنظر می رسد که خانه مهمتر از شغل باشد
- پیدا کردن شغل و خانه هر دو به یکسان مهم هستند
- بنظر می رسد که شما در تصمیم گیری اینکه کدام مهم هستند دچار مشکل می باشید

۶۸ - کدامیک از اقدامات زیر موجب گردید که مراقبت از بیمار روانی از جنبه نگهداری به درمان تبدیل شود؟

- (الف) شوک درمانی
- (ب) پیدایش داروهای روانگردان
- (ج) محیط درمانی
- (د) رواندرمانی

۶۹ - عوارض آنتی کولینرژیک داروهای ضد سایکوز کدام است؟

- (الف) آگرانولوسیتوز و درماتیت
- (ب) تاری دید و اسهال
- (ج) خشکی دهان و اشکال در بلعیدن
- (د) تعرق زیاد و پوست مرطوب

۷۰ - عوارض شایع داروی لیتیوم کدام است؟

- (الف) کهیر، علائم پوستی، اضطراب
- (ب) کاهش وزن، خشکی چشم، کاهش گلبولهای سفید
- (ج) افسردگی، فراموشی، افزایش قند خون
- (د) علائم گوارشی، تاری دید، ضعف ماهیچه ها

۷۱ - علائم جسمی واکنش سوگ کدام است؟

- (الف) گریه کردن، تپش قلب، غمگینی
- (ب) کاهش اشتها، احساس فشار روی قفسه سینه، ضعف و خستگی
- (ج) بیخوابی، بیوست، ناامیدی
- (د) خارش، تنگی نفس، احساس فشار روی قفسه سینه

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

۷۲ - نیاز به مصرف بیشتر مواد (Substance) برای رسیدن به اثر مطلوب کدام است؟

- (الف) مقاومت (Tolerance)
- (ب) سندروم محرومیت (Withdrawal)
- (ج) مسمومیت (Poisoning)
- (د) مصرف بیش از حد (Overdose)

۷۳ - مداخلات درمانی در اختلال اضطرابی کدام است؟

- (الف) مشاوره، دارو درمانی، شوک درمانی
- (ب) دارو درمانی، شوک درمانی، رفتار درمانی
- (ج) مشاوره، روان درمانی، دارو درمانی
- (د) رفتار درمانی، روان درمانی، دارو درمانی

۷۴ - اختلال وسواس- اجبار کدام است؟

- (الف) تکرار رفتار، ارادی است
- (ب) تکرار رفتار، غیر ارادی و اجباری است
- (ج) تکرار رفتار، اختیاری و گاهی اجباری است
- (د) تکرار رفتار، ارادی و ناآگاهانه است

۷۵ - بیشترین روش‌های درمان اختلالات خلقی کدام است؟

(الف) دارو درمانی

(ب) دارو درمانی به همراه درمان‌های تعاملی شناختی رفتاری

(ج) دارو درمانی به همراه شوک درمانی

(د) درمان‌های تعامل شناختی رفتاری

۷۶ - داروهای سه حلقه‌ای ضد افسردگی، منع مصرف در کدام اختلال دارد؟

(د) ادراری

(ج) خواب

(ب) تنفسی

(الف) قلبی

۷۷ - پرحرفی، هذیان بزرگ منشی، خودمحوری (Omnipotence) در کدامیک از اختلالات زیر دیده می‌شود؟

(د) شخصیت پارانوئید

(ج) هیستری

(ب) مانیا

(الف) اختلالات پارانوئید

۷۸ - عواملی که می‌تواند سبب کاهش عملکرد شناختی در آزادایم رشود کدام است؟

(الف) بعضی داروها، اختلالات آب و الکترولیت، عوامل نوروبیولوژیکی

(ب) سن، از دست دادن نزدیکان، کما

(ج) تغییرات محیطی، مهاجرت، داروهای قلبی

(د) تداخل دارویی، اضطراب، بی‌اشتهاایی

۷۹ - مداخلات پرستاری در اینمنی بیمار آزادایم رشود کدام است؟

(الف) محیط درمانی، رفتار درمانی، دارو درمانی

(ب) محیط درمانی، شناخت درمانی، دارو درمانی

(ج) تحریک حسی و حرکتی، تنظیم خواب، دارو درمانی

(د) محیط درمانی، کاهش آگاهی به مکان و زمان

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

۸۰ - مداخلات پرستاری در بیمار اسکیزوفرن در چه فازهایی انجام می‌شود؟

(الف) درمانی، پیشگیری، شوک درمانی

(ب) حاد، نگهدارنده، توانبخشی

(ج) حاد، مزمن، پیشگیری

(د) حاد، درمانی، عودکنندگی

پرستاری بهداشت و جامعه

۸۱ - تأکید بر توجه پرستاران به ارزش‌های بیماران در امر مراقبت‌های بهداشتی و عدم قضاوت در مورد فرهنگ بیماران

براساس اعتقادات شخصی پرستار، برکدام دلالت دارد؟

(الف) Ethnocentrism (ب) Cultural Blindness (ج) Cultural Relativism (د) Prejudice

۸۲ - کدام حاصل تضاد بین اهداف فردی و گروه است؟

(الف) افزایش پویایی

(ب) افزایش بهره وری

(ج) کاهش پویایی

(د) کاهش همبستگی

۸۳ - هدف برنامه «افراد سالم در شهر سالم» کدام است؟

(الف) افزایش سالهای زندگی سالم

(ب) افزایش مشارکت جامعه

(ج) بررسی سلامت جامعه

(د) برنامه‌ریزی در سطح جامعه

۸۴ - کدام اقدام برای سالم‌مندان مقیم خانه سالم‌مندان در سطح پیشگیری اول قرار دارد؟

- (الف) واکسیناسیون برای پنوموکوک
- (ب) بررسی جامع سطح سلامت
- (ج) آموزش مراقبت از زخم پای دیابتیک
- (د) غربالگری پر فشاری خون

۸۵ - گسترش شبکه های بهداشت و درمان که از سال ۱۳۶۴ شروع شد برای کدام هدف است؟

- (الف) دسترسی همه به مراقبت بهداشتی
- (ب) پیشگیری از مهاجرت به شهرها
- (ج) کاهش بار بیماریهای جامعه
- (د) کاهش هزینه های بخش سلامت

۸۶ - تعییه هود برای اتاق آماده سازی دارو جزو کدام است؟

- (د) پیشگیری ثانویه
- (ج) جداسازی مواد مضر
- (ب) کنترل مهندسی
- (الف) کنترل مدیریتی

۸۷ - میزان میرایی از سرطان ریه در کشورمان از کدام الگو تعییت می‌کند؟

- (د) مکانی - زمانی
- (ج) روند بلند مدت
- (ب) اپیدمی نقطه ای
- (الف) روند دوره ای

۸۸ - برای بررسی بیماریهای نادر کدام نوع طرح تحقیق همه‌گیر شناختی مناسب‌تر است؟

- (د) کارآزمایی
- (ج) مورد شاهدی
- (ب) بوم شناختی
- (الف) همگروهی

۸۹ - پرستار بهداشت جامعه برای ارتقای سلامت جامعه روش‌تایی با نهادهای جامعه ارتباط برقرار می‌کند. این اقدام با

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

- (الف) برابری توزیع مراقبت‌ها
- (ب) اولویت‌بندی مشکلات جامعه
- (ج) مشارکت جامعه
- (د) هماهنگی بین بخشی

۹۰ - کدام واکسن در بدو تولد، قبل از ترجیح نوزاد تزریق می‌شود؟

- (الف) ام.ام. آر (سرخک، سرخجه، محمک)
- (ب) هپاتیت ب
- (ج) پنوموکوک
- (د) هپاتیت آ

۹۱ - کدام مربوط به پیشگیری سطح ۲ است؟

- (الف) توزیع رایگان سرنگ به معتادان تزریقی
- (ب) غربالگری معتادان تزریقی برای HIV
- (ج) آموزش روش‌های انتقال بیماریها
- (د) معرفی معتادان به مراکز ترک اعتیاد

- ۹۲ - پرستار بهداشت جامعه طی بازدید یک منزل در بالای شهر در فصل زمستان، متوجه عدم تناسب لباس سالمند عضو خانواده در حیاط منزل با فصل سرما می‌شود. کدام بیشتر محتمل است؟
- الف) غفلت ب) سوء رفتار ج) فقر مالی د) افسردگی
- ۹۳ - مجموعه اقدامات برای دستیابی به نتایج بهداشتی مورد نظر، تعریف کدام است؟
- الف) سیاست بهداشتی ب) مقررات بهداشتی ج) رویه بهداشتی د) قوانین بهداشتی
- ۹۴ - برقراری ارتباط بین فردی با جامعه، سیستم، خانواده یا افراد برای افزایش ظرفیت آنها در خود مراقبتی و تطابق کدام است؟
- الف) آموزش سلامت ب) ارتباط درمانی ج) پیگیری د) مشاوره
- ۹۵ - کدام منبع نقطه‌ای آلدگی هوا در جامعه محلی، محسوب می‌شود؟
- الف) وسائل نقلیه ب) وسایل گرمایی ج) مصرف دخانیات د) سوزاندن زباله‌ها
- ۹۶ - تشویق به تولید و توزیع رنگهای محلول در آب و فاقد حلال به چه منظور است؟
- الف) جداسازی مواد شیمیایی مضر ب) جایگزینی مواد شیمیایی مضر ج) کنترل های مهندسی د) کنترل های مدیریتی
- ۹۷ - برای پیشگیری از ابتلا به عفونت‌های منتقله از طریق آب در حین مسافرت استفاده از کدام مناسب است؟
- الف) آب یخ ب) آب چاه و قنات ج) آب های جاری د) آبی که یک دقیقه جوشیده
- ۹۸ - مصرف دارو تحت مشاهده مستقیم کارکنان مراقبت بهداشتی (DOT) برای کدام بیماری مطرح است؟
- الف) ایدز ب) سفلیس ج) هپاتیت د) سل
- ۹۹ - در افرادی که از داروهای ضعیف کننده ایمنی بدن استفاده می‌کنند، کدام واکسن منع مصرف دارد؟
- الف) کزار ب) دیفتی ج) سیاه‌سرفه د) ب.ث.
- ۱۰۰ - یافتن بیماران مalaria ای از بین مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی چه نام دارد؟
- الف) مراقبت فعال ب) مراقبت انفعالی ج) درمان موارد د) پیشگیری دارویی
- پرستاری بهداشت مادران و نوزادان**
- ۱۰۱ - در ارزیابی سلامت جنین، اساس تست بدون استرس (NST) کدام است؟
- الف) افزایش تعداد ضربان قلب جنین در پاسخ به حرکات جنین است. ب) نمونه‌گیری از خون مادری است جهت تشخیص کاریوتیپ جنین. ج) تحريك رحم جهت انقباض و ارزیابی ضربان قلب جنین است. د) نوعی سونوگرافی داپلر از حرکات پاهای جنین است.
- ۱۰۲ - پرستار در آموزش به مادر باردار، کدامیک از موارد زیر را به عنوان علائم خطرناک و هشداردهنده گوشزد می‌کند؟
- الف) تاری دید و سردرد مداوم ب) تهوع استفراغ صبحگاهی ج) کرامپ پا یا کرامپ شکمی د) هموروئید و یبوست

- ۱۰۳ - در خانم بارداری، آخرین قاعده‌گی (LMP) در تاریخ ۹۱/۷/۲۰ بوده است. به عنوان پرستار، تاریخ احتمالی زایمان را در چه زمانی تخمین می‌زنید؟ (EDC)
- (الف) ۹۲/۳/۲۷
(ب) ۹۲/۳/۱۳
(ج) ۹۲/۴/۲۷
(د) ۹۱/۹/۲۷
- ۱۰۴ - کدام حالت (Position) خوابیده در زنان باردار، موجب سندروم کاهش فشار خون می‌گردد؟
- (الف) به پهلوی چپ
(ب) به پهلوی راست
(ج) به روی شکم
(د) به پشت
- ۱۰۵ - در انجام فرآیند پرستاری و آموزش به مادر باردار، فواصل مراجعه به درمانگاه کنترل بارداری (پره ناتال) چگونه توصیه می‌شود؟
- (الف) تا هفته ۲۸ هر چهارهفته یک بار، از ۲۸ تا ۳۶ هفتگی هر دو هفته یک بار، از هفته ۳۶ تا زایمان هر هفته
(ب) در نیمه اول بارداری (۲۰ هفته اول) هر چهار هفته یک بار و بعد از آن تا زایمان هر دو هفته یک بار
(ج) تا هفته ۲۸ هر دو هفته یک بار، از ۲۸ هفتگی تا زایمان هر هفته یک بار
(د) فاصله زمانی مراجعه به درمانگاه بنا به سلیقه و تمایل مادر می‌باشد
- ۱۰۶ - جفت از هفته چندم بعد از لقاح، کاملاً تشکیل شده و عملکرد خود را انجام می‌دهد؟
- (الف) چهارم
(ب) هفتم
(ج) نهم
(د) دهم
- ۱۰۷ - هورمون مترشحه از جفت کدام است؟
- (الف) پروژسترون - پرولاکتین - h.P.L
(ب) پرولاکتین - h.C.G - T.S.H
(ج) پرولاکتین - اکسی توسین - T.S.H
(د) استروژن - پروژسترون - h.C.G
- ۱۰۸ - جهت مراقبت شدیدتر قبل از زایمان، پرستار در آموزش به هدججی باردار، کدام مشکل را گوشزد می‌کند؟
- (الف) مولتی پار بودن مادر (بالای دو فرزند)
(ب) بیماری‌های مزمن (فسار خون بالا، دیابت و....) و سابقه نازایی
(ج) آرترو و روماتوئید حاد و مزمن
(د) واریس و کرامپ در پاها
- ۱۰۹ - ارتفاع قله رحم مادر بارداری ۲۸ سانتی‌متر است. پرستار سن حاملگی (سن جنینی) را براساس روش مک دونالد (بر حسب ماه) را چه عددی تخمین می‌زند؟
- (الف) ۶
(ب) ۷
(ج) ۸
(د) ۹
- ۱۱۰ - جهت اندازه‌گیری و ارزیابی میزان آلفافیتوپروتئین (AFP)، به کدام طریق متوصل می‌شوند؟
- (الف) فقط مایع آمنیوتیک
(ب) ترشحات حلق
(ج) ترشحات واژینال
(د) سرم خون مادر یا مایع آمنیوتیک
- ۱۱۱ - کدام مورد زیر، از عوارض شایع بی‌حسی ابی دورال در زایمان است؟
- (الف) هیپوتانسیون
(ب) تهوع
(ج) کرامپ شکمی
(د) خستگی
- ۱۱۲ - دیستوژی (Dystocia) به چه معنی است؟
- (الف) به هرگونه اختلال هورمونی منجر به ناباروری در زنان
(ب) به هر گونه زایمان سخت طولانی و غیرطبیعی
(ج) نوعی شستشوی واژن بعد از مقاومت غیرایمن
(د) خونریزی واژینال شدید در بارداری

- ۱۱۳ - تزریق کدام واکسن در دوران بارداری مجاز است؟
- الف) سرخک ب) سرخچه ج) اوریون د) کزاز
- ۱۱۴ - ۴۸ ساعت بعد از تولد نوزاد طبیعی، بروز زردی چه نام دارد؟
- الف) ناشی از شیر مادر ب) پاتولوژیک ج) فیزیولوژیک د) مادرزادی
- ۱۱۵ - با تماس مستقیم بدن نوزاد با سطح سرد، گرمای بدن نوزاد به چه شیوه‌ای از دست می‌رود؟
- الف) تبخیر ب) تشعشع ج) انتقال د) انتشار
- ۱۱۶ - اولین اقدام فوری پرستاری، بعد از تولد نوزاد در اتاق زایمان چیست؟
- الف) باز کردن راههای تنفسی و گرم نگاهداشت نوزاد ب) وصل کردن سرم قندی جهت پیشگیری از کاهش قند خون ج) ریختن قطره چشمی سولفاستامید د) ماساژ دست و پای نوزاد
- ۱۱۷ - ملاج یا فونتاںل قدامی نوزاد چه زمانی بسته می‌شود؟
- الف) دوهفتگی ب) دوازده تا هجده ماهگی ج) هشت هفتگی د) دو تا چهار ماهگی
- ۱۱۸ - مادر باردار از پرستار سؤال می‌کند «ممنوعیت مصرف دارو در کدام دوران بارداری» مورد تأکید است، پاسخ چیست؟
- الف) سه ماهه اول ب) سه ماهه دوم ج) سه ماهه سوم د) نیمه دوم بارداری
- ۱۱۹ - در صورتی که خانمی بخواهد از روش دوره‌ای پیشگیری از بارداری استفاده کند و سیکل قاعده‌گی وی منظم و هر ۲۸ روز یک بار باشد، دوره خطردر سیکل قاعده‌گی ۵ کدام روز پیشتر است؟
- الف) ۱۲ تا ۱۴ ب) ۱۶ تا ۱۴ ج) ۱۶ تا ۱۲ د) ۲۸ تا ۱۶
- ۱۲۰ - استفاده از قرص‌های خوارکی، جهت پیشگیری از بارداری، جزء کدامیک از روش‌های ذیل محسوب می‌شود؟
- الف) شیمیایی ب) دوره‌ای ج) هورمونی د) مکانیکی

زبان انگلیسی

Part one: vocabulary

Directions: Complete the following sentences by using the most suitable word or phrases below each one.

- 121 . I found many of your suggestions very impressive; I intend to some of them in my plan.
- a. disseminate b. incorporate c. perpetuate d. proliferate
- 122 . Health information administrators apply the science of information to the collection, storage, use and of information.
- a. transaction b. transportation c. transfusion d. transmission
- 123 . The patient's reaction toward the problem was complete withdrawal from the society. She ----- any kind of activity in public.
- a. avoided b. surrounded c. confirmed d. advocated

- 124 . Gastroesophageal reflux is now one of the most common of mankind, confusing medical researchers.**
 a. antecedents b. maladies c. expositions d. modalities
- 125 . The goal is to reduce, if not eliminate, all elements of the clubfoot to obtain a functional, flexible, strong, and normal foot.**
 a. deformity b. remedy c. maintenance d. remission
- 126 . The information was welcomed by all members of the committee because of its**
 a. deformity b. ambiguity c. accuracy d. deficiency
- 127 . Patients with end stage cardiac disease, not liable to conventional medical or surgical therapies, are for heart transplantation.**
 a. eligible b. reversible c. notorious d. vigorous
- 128 . Nowadays, heart surgeons some of the most complex and challenging operations.**
 a. segregate b. implicate c. aggravate d. undertake
- 129 . Although the link between increased fiber and decreased risk of colorectal cancer is still uncertain, most nutritionists recommend the inclusion of more fibers in the diet.**
 a. ventilation b. consumption c. domination d. simulation
- 130 . To apply such complicated modalities, we need to have equipment.**
 a. redundant b. primitive c. sophisticated d. outdated
- 131 . In treating a terminally ill patient, the physician should determine whether the benefits of treatment its burdens.**
 a. outburst b. overact c. outweigh d. overrun
- 132 . Any understanding of the purpose of health care is going to be influenced by the economic, social, and psychological of health care providers.**
 a. concerns b. contents c. conflicts d. complexes
- 133 . Many people do not know that they are saved from diseases just by public health**
 a. measures b. interferences c. interactions d. manifestations
- 134 . Although some physicians are not willing to accept AIDS patients, they have an ethical to explain their medical problems.**
 a. inspection b. obligation c. instruction d. hallucination
- 135 . Only the reasonable desires of the individual for health care need to be**
 a. spared b. saturated c. satisfied d. spanned
- 136 . Blood tests are important measures to find signs of some malignancies.**
 a. convertible b. hidden c. forbidden d. disposable
- 137 . Great men's services are to mankind.**
 a. invalid b. vague c. vain d. invaluable
- 138 . Recent research suggests that, on average, half of the children of a person with any rare genetic will inherit the disease.**
 a. defect b. profile c. merit d. make-up
- 139 . Although entirely eradicated in most parts of the globe, malaria is still in some regions.**
 a. prevalent b. nonexistent c. improbable d. permeable
- 140 . Anyone in charge of important computer files must be careful about.....deletion of vital information although various data recovery packages might help undo the deletion.**
 a. advantageous b. sufficient c. calculated d. inadvertent

Part two: Reading comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c & d) below each one. Base your answers on the information given only.

Passage 1

Pharmacology as a scientific discipline dates from the mid-1800s, but its development has taken place over many centuries and has been influenced by many different cultures. The discovery of many drugs and medicinal plants was largely through trial and error. Across the world as tribal man foraged for food, he soon realized that his local woodland areas harboured a variety of roots, barks, berries and leaves which were not only sources of food, but also in some cases possessed medicinal (healing, soothing and therapeutic) properties. He also came across other matters that were highly toxic. Information about such plants was handed down from generation to generation, providing the basis of much of our knowledge today. One such example is the South American Indians, who gave us the first muscle relaxant: a drug called curare that they smeared onto the tips of their spears to immobilize animals when hunting. Today a drug which possesses similar characteristics is used by doctors to relax their patients' muscles during operations.

141 . According to the text, scientific pharmacology

- a. has existed for many centuries
- b. has influenced several cultures
- c. developed due to cultural influences
- d. first appeared in the mid-1800s

142 . Soothing effects of some plants were first discovered by

- a. some tribal men while hunting
- b. tribal people looking for food
- c. tribes surrounded by trees and bushes
- d. passing the drugs from tribe to tribe

143 . 'curare' was originally used by Indians to

- a. cure sick tribal men
- b. have more efficient spears
- c. eliminate pain and infection
- d. kill enemies in tribal wars

144 . The features of the drug, now, resemble those of the drug used by Indians while hunting.

- a. a highly toxic substance
- b. beneficial in surgery
- c. a muscular stimulant
- d. an effective precursor

145 . The passage is mainly trying to indicate the

- a. principles of pharmacology
- b. components of certain drugs
- c. beneficial effects of some drugs
- d. herbal origin of drugs

Passage 2

Society will be working toward a distribution of basic health care that is adequate for the restoration and preservation of health as society defines it. This basic and adequate health care may be called humane insofar as it protects the dignity of the individual person.

When the absence of certain types of health care leads to early death, disfigurement, or loss of functions necessary to take one's place in society, we have certainly fallen below the basic minimum of health care for society. In other words, the absent care is part of the basic and adequate minimum. It is basic because, in our society at our stage of ethical, scientific, and technological development, the dignity of the individual demands that we employ reliable and ordinary means to maintain a certain minimum level of treatment. This minimum requires that the individual gain relief from pain, which destroys the higher human functioning, and restores at least the minimum functioning valued by society; that she be spared a death that is the result of trivial or avoidable circumstances; that she be spared disfigurement that will make her repugnant to her society and herself; and that she be spared a loss of function that will make her unable to share the actions, burdens, and accomplishments that membership in society demands. A poorer society than ours might not be able to address many of these concerns due to its lack of abilities and resources.

146 . According to the passage, humane health care could be defined in terms of

- a. preserving a person's true worth
- b. individual's focus on family concerns
- c. equal distribution of health care resources
- d. considering and protecting social demands

147 . We understand from the passage that individuals

- a. are disfigured despite abundant health care
- b. may die from otherwise curable diseases
- c. share concerns of many other people
- d. are respected if function in a proper manner

148 . The underlined pronoun "she" in the text refers to

- a. a specific person in a poor society
- b. the female patient in need of health
- c. the woman addressed by the writer
- d. every member of the society

149 . The text implies that a/an society might not specify its people's basic health care worries.

- a. developed
- b. malfunctioning
- c. impoverished
- d. affluent

150 . The author of this passage believes that human dignity requires that different societies

- a. have the same level of health care
- b. maintain their own minimal level of health care
- c. address the social groups similarly
- d. contribute to poor countries' health care system

Passage 3

A child born in Sweden is almost 30 times more likely to reach the age of five than a child born in Swaziland. While the national rates conceal variations in mortality between the rich and the poor, urban and rural, it is possible to suggest that national wealth is the key factor in determining mortality. However, the evidence clearly indicates that mortality is affected by factors other than national wealth. The most striking example is the comparison between the United States and Cuba. Though life expectancy in both is virtually identical, the former spends less than \$200 per person on healthcare while the latter spends almost \$4,400 per person. Cooper R et al. (2006) state that much of this is due to relatively small amounts invested in infrastructure combined with a well-developed public health strategy. As Cooper R et al. go on to emphasize, 'if the experience of Cuba could be extended to other poor and middle-income countries, human health would be transformed'. However, since the 1980s Cuba has also been involved in technology developments. The research, development, and marketing of advanced drugs on a worldwide scale illustrate how much can be achieved by a low-income country.

151 . The passage is mostly discussing

- a. the role of national wealth in health
- b. Cuban experience in health promotion
- c. factors reducing mortality rate
- d. mortality rate among the poor and the rich

152 . Mortality rate can be lowered by

- a. low investment in infrastructure
- b. production of advanced drugs
- c. a suitable public health strategy
- d. life expectancy among people

153 . The comparison made between the USA and Cuba the key role of national wealth in lowering mortality rate.

- a. refutes
- b. approves
- c. elaborates
- d. reaffirms

154 . The comparison between the United States and Cuba reveals that

- a. the former spends more on life expectancy
- b. the latter has a better healthcare system
- c. the average longevity in both is the same
- d. life expectancy in the former is higher

155 . According to Cooper et al., in order to promote public health, the Cuban model of health care system should be

- a. modified
- b. abandoned
- c. transformed
- d. followed

Passage 4

Researchers have examined data from 500 men followed for 14 years after a prostate biopsy that was found to be benign. This is the first of a group of studies to be conducted in order to determine if there are subpopulations of men diagnosed with benign conditions that may be at a greater risk for developing prostate cancer. Prostate abnormalities were detected in 11 percent of the patients, and after considering factors including family history of prostate cancer, the researchers concluded that obesity at the time of the initial biopsy was associated with a 57 percent increased risk of developing prostate cancer during the 14 years of follow-up. We don't absolutely know what the true biology is because the association was seen only for prostate cancer that occurred earlier in the follow-up period not in its later years. Therefore, this only reflects the association between the body size and larger prostate size, which is thought to reduce the sensitivity of the needle biopsy. It is possible that the tumors missed by initial biopsy grew and were detected in a follow-up biopsy. Although the association found in this study does not prove cause and effect, it indicates that obesity should be considered a factor for follow-ups after a benign prostate biopsy.

156 . Based on the information presented in the passage, about patients from the followed-up population proved to have prostate abnormalities after some years.

- a. 275
- b. 125
- c. 55
- d. 445

157 . The main purpose of these series of studies is to answer the question of whether

- a. benign prostate cases could develop into malignancies in the course of time
- b. cases decided as cancerous could prove to be benign in the course of time
- c. present techniques of biopsy are reliable indicators of the existence of cancer
- d. family history can be considered as a reliable predictor of prostate cancer

158 . Based on the results of the present study, patients who at the time of initial examination were more likely to develop prostate cancer in the subsequent years.

- a. underwent the needle biopsy technique
- b. failed to follow prescriptions
- c. had a family history of prostate cancer
- d. suffered from obesity

159 . The one claim that the author makes as the most likely reason for the observed results is

- a. when examining obese men, needle biopsy loses its sensitivity in finding cancerous cells
- b. obesity contributes to the development of prostate cancer early in the follow-up
- c. family history may contribute to the development of prostate cancer
- d. diagnosis of benign conditions has lost its credibility over years

160 . The factor that causes the biology of what was observed to become less clear is that

- a. tumors were invariably missed in the initial biopsy
- b. the association between the body size and prostate size was not found
- c. cancers were observed only in the initial years of the follow-up period
- d. only some subpopulations of men developed cancer

Virtual University of Medical Sciences

موفق باشید

بسمه تعالیٰ

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای درخواست‌های بررسی سوالاتی است که در قالب مشخصی ارسال می‌گردد، تا رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

داوطلبان می‌بایست پس از اعلام کلید آزمون در ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۹۲/۳/۱۹ درخواست‌های خود را به صورت اینترنتی در قالب فرم زیر که در شبکه اینترنت قرار گرفته است، حداکثر تا ساعت ۱۶ روز جمعه مورخ ۹۲/۳/۲۴ به نشانی www.sanjeshp.ir ارسال نمایند. لذا درخواست‌هایی که به هر شکل، خارج از این فرم یا بعد از زمان تعیین شده به این مرکز ارسال گردد، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تذکر مهم:

فقط درخواست‌های ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی



کد ملی:	نام خانوادگی:	نام:
---------	---------------	------

نام رشته:	نام درس:	شماره سؤال:	نوع دفترچه:
دانشگاه علوم پزشکی مجازی	نام منبع معتبر	سال انتشار	صفحه پاراگراف
			سطر

Virtual University of Medical Sciences

سوال مورد بررسی:

- بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)
- جواب صحیح ندارد.
- متن سوال صحیح نیست.
- با منبع اعلام شده قابل پاسخگویی نیست.

توضیحات: